

Электронная цифровая подпись

Прохоренко Инга
Олеговна



F C 9 3 E 9 6 B C 8 C 2 1 1 E 9
Бунькова Елена
Борисовна



F C 9 3 E 8 6 A C 8 C 2 1 1 E 9

Утверждено 26 мая 2022 г.

Протокол № 5

председатель Ученого Совета Прохоренко И.О.
ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б.

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ»**

Специальность 33.05.01 Фармация

(уровень специалитета)

Направленность Фармация

Форма обучения: очная

Квалификация (степень) выпускника: Провизор

Срок обучения: 5 лет

Год поступления 2020,2021,2022

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Физическая и коллоидная химия»:

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)	Код контролируемой компетенции (или её части) / и ее формулировка – по желанию	Наименование оценочного средства	Шкала оценивания
1	Предмет, задачи и методы физической и коллоидной химии и ее значение для фармации.	ОПК-1	Устный ответ, стандартизированный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации.	Пятибалльная шкала оценивания
2	Основные понятия и законы химической термодинамики и термохимии.	ОПК-1	Устный ответ, стандартизированный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации.	Пятибалльная шкала оценивания
3	Термодинамика химического равновесия	ОПК-1	Устный ответ, стандартизированный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации.	Пятибалльная шкала оценивания
4	Термодинамика фазовых равновесий	ОПК-1	Устный ответ, стандартизированный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации.	Пятибалльная шкала оценивания
5	Термодинамика разбавленных растворов.	ОПК-1	Устный ответ, стандартизированный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации.	Пятибалльная шкала оценивания
6	Термодинамика растворов электролитов.	ОПК-1	Устный ответ, стандартизированный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации.	Пятибалльная шкала оценивания
7	Термодинамика поверхностных явлений	ОПК-1	Устный ответ, стандартизированный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации.	Пятибалльная шкала оценивания
8	Электрохимия	ОПК-1	Устный ответ, стандартизированный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации.	Пятибалльная шкала оценивания
9	Кинетика химических реакций и катализ	ОПК-1	Устный ответ, стандартизированный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации.	Пятибалльная шкала оценивания

10	Коллоидная химия как наука. Природа, классификация и общие свойства дисперсных систем	ОПК-1	Устный ответ, стандартизованный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации.	Пятибалльная шкала оценивания
11	Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных систем.	ОПК-1	Устный ответ, стандартизованный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации.	Пятибалльная шкала оценивания
12	Электрический заряд коллоидных частиц и электрокинетические явления.	ОПК-1	Устный ответ, стандартизованный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации.	Пятибалльная шкала оценивания
13	Устойчивость и коагуляция коллоидных систем	ОПК-1	Устный ответ, стандартизованный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации.	Пятибалльная шкала оценивания
14	Разные классы коллоидных систем	ОПК-1	Устный ответ, стандартизованный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации, проведение круглого стола	Пятибалльная шкала оценивания

2. Текущий контроль успеваемости на занятиях семинарского типа (семинары, практические занятия, клинические практические занятия, практикумы, лабораторные работы), включая задания самостоятельной работы обучающихся, проводится в формах:

- устный ответ,
 - стандартизованный тестовый контроль,
 - решение ситуационных задач,
 - презентации,
 - проведение круглого стола.

Выбор формы текущего контроля на каждом занятии осуществляется преподавателем. Формы текущего контроля на одном занятии у разных обучающихся могут быть различными. Конкретную форму текущего контроля у каждого обучающегося определяет преподаватель. Количество форм текущего контроля на каждом занятии может быть различным и определяется преподавателем в зависимости от целей и задач занятия.

2.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

2.1.1. Стандартизованный тестовый контроль успеваемости (по темам или разделам)

Тема 1. Предмет, задачи и методы физической и коллоидной химии и ее значение для фармации.

Фармации:

11. Начальная линия СГЭС:

А) наука о веществах и их превращениях;
Б) наука о методах анализа;
В) наука, изучающая закономерности
2. объект изучения физической химии
А) дисперсные системы
Б) коллоидные системы
3. предмет изучения физической химии
А) взаимопревращения дисперсных систем
Б) взаимопревращения любых систем
протекания химических процессов;
Г) наука, изучающая дисперсные системы?

В) любые системы
Г) растворы

В) взаимопревращения коллоидных систем
Г) взаимопревращения в растворах

4. объект изучения колloidной химии
 А) дисперстные системы и поверхностные явления
 Б) коллоидные системы
5. предмет изучения колloidной химии
 А) взаимопревращения в дисперстных системах
 Б) взаимопревращения в любых системах
6. цель изучения физической химии
 А) изучение связей между химическими и физическими явлениями
 Б) определение энергии процессов
7. методы изучения физической химии
 А) строение вещества
 Б) статистический
 В) термодинамический
8. методы изучения колloidной химии
 А) рефрактометрический, турбидиметрический
 Б) статистический
9. колloidная химия
 А) это самостоятельная наука, изучающая дисперстные системы и поверхностные явления
 Б) это раздел физической химии, изучающий дисперстные системы и поверхностные явления
 В) это раздел общей химии, изучающий дисперстные системы и поверхностные явления
10. дисперстные системы – это
 А) основа изучения физической химии
 Б) предмет изучения только колloidной химии
- В) любые системы
 Г) растворы
- В) взаимопревращения в колloidных системах
 Г) взаимопревращения в растворах
- В) изучение показателя преломляемости света
- Г) оптический
 Д) все перечисленные
- В) термодинамический
 Г) оптический
 Д) все перечисленные
- Б) объект изучения колloidной химии
 Г) метод изучения колloidной химии

вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	в	в	б	а	а	а	д	д	а	в

Тема 2. Основные понятия и законы химической термодинамики и термохимии.

- 1.Основной задачей физической химии является утверждение
- а) исследовать закономерности протекания химической реакции во времени и установить химическое равновесие при различных внешних условиях.
 б) изучение веществ, их свойств и прогнозирование исследования вещества в народном хозяйстве.
 в) изучение различных форм существования веществ в различных средах и агрегатных состояниях.
2. Дайте определение термодинамической системе
- а) совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра.
 б) тело или совокупность тел находящихся во взаимодействии и условно обособленных от окружающей среды.
 в) соединения которые, образовались путем притяжения ионов.
3. Изотонический раствор- это
- а) раствор, имеющий одинаковое гидравлическое давление;
 б) раствор, в котором концентрация растворённого вещества приближается к растворимости
 в) раствор, имеющий одинаковое осмотическое давление
4. Какое из нижеприведенных определений характерно для гомогенных реакций
- а) компоненты находятся в разных фазах
 б) исходные вещества находятся в одной фазе, а продукты в другой
 в) исходные вещества и продукты находятся в одной фазе
- 5.Закрытой системой будет являться
- а) система, которая может обмениваться с окружающей средой энергией, но обмен веществом не возможен.
 б) система, которая обменивается и энергией и веществом, может менять свой объем.
 в) система, в которой нет поверхности раздела.
6. Температурная зависимость теплового эффекта при $V=\text{const}$

выражается уравнением Кирхгофа в интегральной форме:

$$a) \Delta U = \Delta U^\circ + \Delta C_V (T - T^\circ) \quad b) \Delta H = \Delta H^\circ + \Delta C_p (T - T^\circ) \quad c) (\partial \Delta U / \partial T) V = \Delta C_V$$

7. Изменение энтропии является критерием протекания самопроизвольного процесса в системе:

- a) изолированной б) закрытой в) открытой

8. Если все компоненты следующей реакции являются газами: $A + 3B \rightleftharpoons C$
соотношение между K_c и K_P равно:

$$a) K_P = K_c (RT)^{-3} \quad b) K_P = K_c RT \quad c) K_P = K_c (RT)^2$$

9. Состояние системы, при котором ее свойства постоянны во времени при наличии потоков энергии и вещества, называется:

- a) начальным, б) стационарным, в) переходным,
г) стандартным, д) конечным.

10. Каково соотношение между C_p и C_v для идеального газа?

$$a) C_p + C_v = R \quad b) C_p = C_v + R \quad c) C_p / C_v = R \quad d) C_p = C_v + RT$$

вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	Б	Б	В	В	А	А	А	А	Б	Б

Тема 3. Термодинамика химического равновесия

1. Сформулируйте принцип Ле-Шателье

- а) внешнее воздействие, нарушающее равновесие в равновесной системе, вызывает в ней изменения, направленные в сторону усиления этого воздействия
б) внешнее воздействие, нарушающее равновесие в равновесной системе, не вызывает в ней изменения
в) внешнее воздействие, нарушающее равновесие в равновесной системе, вызывает в ней изменения, направленные в сторону ослабления этого воздействия

2. Температурная зависимость константы химического равновесия выражается при $V\text{-const}$:

$$a) \frac{d \ln K_c}{dT} = \Delta U / RT^2 \quad b) \frac{d \ln K_p}{dT} = \Delta U / RT^2 \quad c) \Delta G^\circ = -RT \ln K_p$$

3. Температурная зависимость константы химического равновесия выражается при $P\text{-const}$:

$$a) \frac{d \ln K_c}{dP} = \Delta U / RT^2 \quad b) \frac{d \ln K_p}{dP} = \Delta U / RT^2 \quad c) \Delta G^\circ = -RT \ln K_p$$

4. Изменение энтропии является критерием протекания самопроизвольного

- a) изолированной б) закрытой процесса в системе в) открытой

5. Можно ли по изменению энтропии судить о направлении протекания процесса?

Да, если система:

- а) закрытая, б) изолированная, в) открытая, г) в любых типах систем, д) только в гетерогенных.

6. Число микросостояний (W) в термодинамической системе равно 1

Чему равно значение энтропии (Дж/моль·К)?

- a) 1 б) 0 в) e^W г) e^{-W}

7. Зависимость химического потенциала от активности компонента реакции:

- а) линейная б) параболическая в) логарифмическая г) экспоненциальная

8. В соответствии с изотермой химической реакции при $K_a < P_a$:

$$a) \Delta G_{pq} > 0 \quad b) \Delta G_{pq} < 0 \quad c) \Delta G_{pq} = 0 \quad d) \Delta G_{pq} = \Delta G_{pq}^0$$

9. Из зависимости между термодинамическими потенциалами и константой химического равновесия при соотношении $P\text{-const}$, если $K_p > 1$, следует соотношение:

$$a) \Delta G^\circ = 0 \quad b) \Delta G^\circ < 0 \quad c) \Delta G^\circ > 0$$

10. Основным условием фазового равновесия системы при $P, T=\text{const}$ является:

- a) $\Delta G = 0$ б) $\Delta A = 0$ в) $\Delta S = 0$

вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	в	а	б	а	б	б	б	в	б	а

Тема 4. Термодинамика фазовых равновесий

1. Энергия колебательного движения атомов в молекуле $^{19}\text{F}^{79}\text{Br}$ на нулевом колебательном квантовом уровне при $\omega_e=672,6 \times 10^2 \text{ м}^{-1}$; $x_e=6,69 \times 10^{-3}$ равна:

- а) $0,34 \times 10^{-20} \text{ Дж}$ б) $1,06 \times 10^{-20} \text{ Дж}$ в) $0,66 \times 10^{-20} \text{ Дж}$

2. Удельная электрическая проводимость раствора KOH концентрации 4,2% при 18° равна $14,64 \text{ См}/\text{м}$. Плотность раствора $1,038 \text{ г}/\text{см}^3$. Эквивалентная электропроводимость равна:

- а) 18,86 б) 8,86 в) $34,67 \text{ См} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{экв}^{-1}$

3. Температурный коэффициент реакции $\gamma=2$. При повышении температуры от 223 до 373 К скорость химической реакции увеличивается:

- а) 30406 б) 32768 в) 15689 раз


4. Коэффициент распределения йода между амиловым спиртом и водой при 25°C в спирте /С I_2 в воде = 230. При равновесной концентрации йода в водном слое 0,2 г/л, концентрация йода в амиловом спирте равна:

- а) 35,16 г/л б) 46,0 г/л в) 57,1 г/л

5. Энергия вращательного движения атомов в молекуле $^{19}\text{F}^{79}\text{Br}$ на вращательном квантовом уровне $\gamma=1$, при равновесном межъядерном расстоянии $r_e=1,7555 \times 10^{-10} \text{ м}$ равна:

- а) $1,4109 \times 10^{-22} \text{ Дж}$ б) $0,1419 \times 10^{-22} \text{ Дж}$ в) $0,8516 \times 10^{-22} \text{ Дж}$

6. Диаграмма $T - \text{состав}$.



состав

Данная диаграмма есть диаграмма

- а) кипения двух жидкостей с ограниченной растворимостью
б) кипения двух неограниченно смешивающихся жидкостей
в) растворимости двух несмешивающихся жидкостей

7. Кривая 1 есть:

- а) кривая, зависимости P насыщенного пара от состава жидкости
б) кривая температур кипения жидкости для ее различных составов
в) кривая зависимости температуры кипения жидкости от состава насыщенного пара.

8. Заштрихованная область на диаграмме соответствует существованию:

- а) жидкой фазы б) газовой фазы
в) жидкости и пара г) 3-х фаз одновременно

9. Представленная диаграмма соответствует:

- а) бинарной идеальной системе б) однокомпонентной идеальной системе
в) 3-компонентной системе г) системе с положительным отклонением от закона Рауля

10. Укажите максимальное число фаз однокомпонентной системы, которые могут одновременно находиться в состоянии термодинамического равновесия.

- а) 4 б) 2 в) 3 г) 1

вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	в	а	б	б	б	в	б	в	в	г

Тема 5. Термодинамика разбавленных растворов.

1. Пары 0,0240 кг вещества при 27°C и 912 мм рт.ст. занимают пространство объёмом 0,0250 м³. Какова молярная масса этого вещества?

- а) $1,22 \cdot 10^5$ Па
- б) $1,96 \cdot 10^2$ кг/моль
- в) $1,11 \cdot 10$ моль/м

2. Степень гидролиза определяют как

- а) отношение количества соли, подвергшейся гидролизу, к общему количеству растворенной соли.
- б) отношение количества основания, подвергшегося гидролизу, к общему количеству растворенного основания.
- в) отношение количества кислоты, подвергшейся гидролизу, к общему количеству растворенной кислоты.

3. Закон Кирхгоффа имеет следующую формулировку

- а) температурный коэффициент теплового эффекта изобарного или изохорного процесса равен изменению изобарной или изохорной теплоемкости системы, происходящему в результате процесса.
- б) температурный коэффициент теплового эффекта изохорного процесса равен изменению изохорной теплоемкости системы, происходящему в результате процесса.
- в) температурный коэффициент теплового изобарного процесса равен изменению изобарной теплоемкости системы, происходящему в результате процесса
- г) среди перечисленного нет правильного ответа

4. Криоскопию рассматривают как

- а) метод определения молекулярных масс по повышению температуры замерзания раствора
- б) метод определения молекулярных масс по снижению температуры замерзания раствора
- в) метод определения молекулярных масс по повышению точки кипения раствора

5. Сформулируйте правило Вант-Гоффа:

- а) при повышении температуры на каждые 10°C скорость химической реакции увеличивается в 2-4 раза
- б) при понижении температуры на каждые 10°C скорость химической реакции увеличивается в 2-4 раза
- в) при повышении температуры на каждые 10°C скорость химической реакции уменьшается в 2-4 раза

6. Факторы, влияющие на скорость химических реакций:

- а) природа реагирующих веществ, концентрация, физическое состояние
- б) концентрация реагирующих веществ, объем, температура
- в) концентрация, давление, температура

7. Из двух растворов гипотоническим называют раствор, у которого осмотическое давление:

- а) меньше
- б) больше
- в) одинаково

8. Осмотическое давление раствора хлорида натрия с молярной концентрацией 0,1 моль/л (изотонический коэффициент 1,95) при 25 °C равно ____ кПа:

- а) 247,6
- б) 482,9
- в) 20,8
- г) 40,5

9. Процесс перехода молекул растворителя через полупроницаемую мембрану из раствора с меньшей концентрацией в раствор с большей концентрацией называется:

- а) электролитическая диссоциация
- б) осмос
- в) гидролиз
- г) диффузия

10. Осмотическое давление раствора глюкозы с молярной концентрацией 0,1 моль/л при 25°C равно ____ кПа:

- а) 61,9
- б) 51,6
- в) 123,8
- г) 247,6

вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ответ	б	а	а	б	в	а	б	г	а	б
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Тема 6. Термодинамика растворов электролитов.

1. Уменьшение удельной электропроводности сильных электролитов в концентрированных растворах по сравнению с разбавленными связано с:

- а. уменьшением степени диссоциации электролита;
- б. увеличением сил электростатического взаимодействия между ионами;
- в. образованием ассоциатов (ионных двойников, тройников и т.д.);
- г. интенсификацией процесса образования ионных атмосфер.

2. Значительно большая скорость движения ионов H^+ и OH^- в водной среде по сравнению с другими ионами объясняется:

- а. малыми размерами этих ионов;
- б. отсутствием у этих ионов гидратной оболочки;
- в. эстафетным механизмом перемещения данных ионов;
- г. большой плотностью электрического заряда у данных ионов.

3. Удельная электропроводность растворов электролитов по сравнению с металлическими проводниками:

- а. значительно выше;
- б. во много раз меньше;
- в. находится примерно на одинаковом уровне;
- г. в зависимости от природы электролита может иметь как большее, так и меньшее значение.

4. Эквивалентная электропроводность в системе СИ характеризует:

- а. электрическую проводимость раствора, содержащего 1 моль химического эквивалента растворенного вещества;
- б. электрическую проводимость 1 м³ раствора электролита;
- в. электрическую проводимость 1 м³ раствора, содержащего 1 моль электролита;
- г. электрическую проводимость раствора, содержащего 1 моль растворенного вещества.

5. Для сильных и слабых электролитов эквивалентная электропроводность:

- а. возрастает с увеличением концентрации раствора;
- б. возрастает с уменьшением концентрации раствора;
- в. зависит от их природы;
- г. возрастает с увеличением температуры.

6. Эквивалентная электропроводность достигает максимального значения:

- а. в насыщенных растворах электролитов;
- б. в сильно разбавленных растворах электролитов;
- в. в растворах, содержащих 1 моль растворенного вещества;
- г. в растворах, содержащих 1 г растворенного вещества.

6. В сильно-разбавленных растворах электролитов λ_∞ приобретает наибольшее значение, т.к.:

- а. в этом случае количество ионов электролита достигает своей максимальной величины;
- б. взаимодействия между ионами в растворе отсутствуют;
- в. степень диссоциации как сильных так и слабых электролитов приближается к 1;
- г. образование ионных атмосфер не происходит.

7. Серебрянная пластинка, покрытая слоем хлорида серебра и опущенная в насыщенный раствор хлорида калия, является:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| а. электродом первого рода; | в. редокс-электродом; |
| б. электродом второго рода; | г. необратимым электродом. |

8. В каком ряду металлы расположены по возрастанию их восстановительной активности в реакциях протекающих в водной среде:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| а. Ag, Fe, Li, Na; | в. Na, Zn, Fe, Cu; |
| б. Zn, Al, Mg, K; | г. Na, Ca, K, Li; |

9. В каком ряду ионы металлов расположены по возрастанию их окислительной активности в реакциях протекающих в водной среде?

- | | |
|---|--|
| а. Li^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} ; | в. Hg^{2+} , Ag^+ , Cu^{2+} , Fe^{2+} ; |
| б. K^+ , Cu^{2+} , Ag^+ , Au^{3+} ; | г. Mg^{2+} , Pb^{2+} , Al^{3+} , Cr^{3+} . |

10. Примером электродов второго рода могут служить:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| а. цинковый электрод; | в. каломельный электрод; |
| б. водородный электрод; | г. стеклянный электрод. |

вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	а	в	г	в	а	б	г	в	в	а

Тема 7. Термодинамика поверхностных явлений

1. Неподвижная поверхность раздела возникает на границе:

- a. жидкость – газ;
- b. жидкость – твёрдое тело;
- c. жидкость – жидкость;
- d. твёрдое тело – газ.

2. Сорбией называется:

- a. притяжение (сцепление или прилипание) приведённых в контакт поверхностей двух конденсированных фаз;
- b. самопроизвольное изменение формы граничной поверхности;
- c. самопроизвольное накопление (поглощение) газообразного или растворённого в жидкости вещества на поверхности либо в объеме конденсированной фазы (твёрдого тела или жидкости);
- d. образование поверхности раздела между двумя несмешивающимися фазами.

3. Адгезией называется:

- a. притяжение (сцепление или прилипание) приведённых в контакт поверхностей двух конденсированных фаз;
- b. самопроизвольное изменение формы граничной поверхности;
- c. самопроизвольное накопление (поглощение) газообразного или растворённого в жидкости вещества на поверхности либо в объеме конденсированной фазы (твёрдого тела или жидкости);
- d. образование поверхности раздела между двумя несмешивающимися фазами.

4. Адсорбция – это:

- a. накопление частиц адсорбтива на поверхности адсорбента;
- b. накопление частиц адсорбента на поверхности адсорбтива;
- c. накопление частиц адсорбата на поверхности адсорбтива;
- d. накопление частиц адсорбата внутри адсорбента.

5. Абсорбция – это:

- a. объемное поглощение газообразного вещества конденсированной фазой;
- b. процесс смешивания между собой различных газов;
- c. объемное поглощение растворённого в жидкости вещества твердой фазой;
- d. процесс смешивания между собой двух взаиморастворимых жидкостей.

6. Физической сорбией называется процесс:

- a. накопления одного вещества на поверхности или в объеме другого вещества, происходящий за счёт действия сил химической связи;
- b. накопления одного вещества на поверхности или в объеме другого вещества, происходящий за счёт действия межмолекулярных или ван-дер-ваальсовых сил;
- c. накопления одного вещества на поверхности или в объеме другого вещества, сопровождающийся образованием новых химических соединений;
- d. накопления сорбтива на поверхности или в объеме сорбента, не сопровождающийся химическим взаимодействием, приводящим к образованию новых веществ.

7. Хемосорбция – это процесс избирательного накопления сорбтива на поверхности или в объеме сорбента:

- a. происходящий за счёт химического взаимодействия и приводящий к образованию новых веществ;
- b. при котором частицы обоих взаимодействующих веществ не теряют своей индивидуальности;
- c. происходящий за счёт сил кулоновского взаимодействия между заряженными частицами, которые при этом не теряют своей индивидуальности;
- d. сопровождающийся образованием новых соединений, которые не образуют самостоятельную фазу.

8. Физическая сорбция в отличие от хемосорбции:

- a. является обратимым процессом;
- b. протекает с незначительным тепловым эффектом ($Q \leq 20 \text{ кДж/моль}$)
- c. является необратимым процессом;
- d. определяется только временем диффузии сорбтива к поверхности сорбента и не зависит от активационного фактора.

9. Древесный уголь, сажа, графит лучше адсорбируют:

- a. неполярные органические жидкости;

- б. полярные органические и неорганические жидкости;
- в. электролиты из водных растворов;
- г. неэлектролиты из водных растворов.

10. Поверхностно – неактивные вещества:

- а. повышают поверхностное натяжение растворителя, только присутствуя в растворах в больших количествах;
- б. изменяют поверхностное натяжение растворителя только при малых концентрациях;
- в. практически не изменяют поверхностное натяжение растворителя, присутствуя в растворе даже в значительных количествах;
- г. не способны растворяться в растворителе.

вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	г	А	В	Г	В	Б	А	б	А	б

Тема 8. Электрохимия

1. При 18°C удельная электрическая проводимость раствора Mg(NO₃)₂

концентрации 5% равна 4,38 См/м. Плотность его 1,038 г/см³. Кажущаяся степень диссоциации Mg (NO₃)₂ в растворе равна:

- а) 58,41%
- б) 34,71%
- в) 24,89%

2. Для реакции 2NO₂=2NO+O₂ константы скорости при T1=600К и T2=645К

соответственно равны 83,9 и 407 (мин)⁻¹ (кмоль/м³)⁻². Энергия активации равна:

- а) 49,037x10³
- б) 193,640x10³
- в) 65,854x10³ Дж/моль

3. Энергия вращательного движения атомов в молекуле 19F79Br на вращательном квантовом уровне γ=1, при равновесном межъядерном расстоянии ge=1,7555x 10⁻¹⁰ м равна:

- а) 1,4109x10⁻²²Дж
- б) 0,1419x10⁻²²Дж
- в) 0,8516x10⁻²²Дж

4. При 18°C удельная электрическая проводимость раствора Mg(NO₃)₂

концентрации 5% равна 4,38 См/м. Плотность его 1,038 г/см³. Кажущаяся степень диссоциации Mg (NO₃)₂ в растворе равна:

- а) 58,41%
- б) 34,71%
- в) 24,89%

5. Что такое степень диссоциации:

- а. это отношение продиссоциировавших молекул к общему числу частиц электролита в растворе;
- б. это отношение продиссоциировавших молекул к числу непродиссоциировавших молекул раствора;
- в. это отношение исходных молекул раствора электролита к количеству продиссоциировавших молекул.

6. Как влияет концентрация на величину степени диссоциации:

- а. степень диссоциации уменьшается;
- в. остается постоянной.
- б. степень диссоциации растет;

7. Как можно рассчитать коэффициент активности:

- а. по уравнению Дебая-Хюкеля;
- в. по уравнению ионной силы раствора
- б. по уравнению Оствальда;

8. Чему равна ионная сила раствора?

- а. Полусумме произведений молярности каждого иона на квадрат его заряда;
- б. полусумме произведений концентрации каждого иона на величину коэффициента активности;
- в. квадрату заряда на полусумму активностей всех ионов

9. Мера активной кислотности среды-рН это:

- а. отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода;
- б. общая кислотность раствора;
- в. водородный показатель амфотерного электролита

10. Что понимают под удельной электропроводностью:

- а. это величина, обратная сопротивлению одного кубического метра раствора с ребром длиной 1 м;
- б. это величина, эквивалентная сопротивлению одного кубического метра раствора с ребром, длиной 1 м;
- в. это удельная проводимость раствора электролита при единичном заряде поверхности

вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ответ	а	б	б	а	В	Б	А	В	Б	а
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Тема 9. Кинетика химических реакций и катализ

1. Сформулируйте правило Вант-Гоффа:

- а) при повышении температуры на каждые 10°C скорость химической реакции увеличивается в 2-4 раза
- б) при понижении температуры на каждые 10°C скорость химической реакции увеличивается в 2-4 раза
- в) при повышении температуры на каждые 10°C скорость химической реакции уменьшается в 2-4 раза

2. Факторы, влияющие на скорость химических реакций:

- а) природа реагирующих веществ, концентрация, физическое состояние
- б) концентрация реагирующих веществ, объем, температура
- в) концентрация, давление, температура

3. Скорость диффузии вещества зависит от

- а) от массы молекул
- б) от формы молекул
- в) от концентрации
- г) площади поверхности

4. Абсолютные скорости ионов K^+ и ClO_4^- при 18°C , соответственно равны

$6,604 \times 10^{-8}$ и $6,102 \times 10^{-8}$ м 2 /с. А числа переноса иона K^+ и ClO_4^- равны:

- а) 0,4809; 0,5191
- б) 0,3701; 0,4704
- в) 0,8901; 0,1201

5. Константа скорости реакции инверсии тростникового сахара при температуре T равна $5,3 \times 10^{-5}$ мин $^{-1}$. Время, в течении которого прореагирует 90% сахара, равно:

- а) 37565
- б) 43445
- в) 27165 мин

6. По какой величине сравнивают скорости химических реакций:

- а. по величине константы скорости реакции;
- б. по величине скорости реакции;
- в. по времени окончания реакции;
- г. по концентрации реагирующих веществ
- д. по концентрации продуктов реакции

7. Правильно ли выражение: «Константа скорости химической реакции есть скорость реакции при концентрации реагирующих веществ, равных единице».

- а. Да
- б. Нет
- в. Да, если концентрации реагирующих веществ не равны 1.

8. Что такое катализ:

- а. Это изменение скорости химической реакции;
- б. Это увеличение скорости химической реакции;
- в. Это уменьшение скорости химической реакции;
- г. Это промышленный синтез химических веществ;
- д. Это лабораторный синтез химических веществ.

9. Катализаторы:

- а. Не влияют на величину константы равновесия химической реакции;
- б. Увеличивают скорость прямой реакции в обратимой реакции;
- в. Увеличивают скорость обратной реакции в обратимом процессе;
- г. Не влияют на скорость обратимых реакций.

10. Температурный коэффициент скорости химической реакции =4. Во сколько раз изменится скорость этой реакции при изменении температуры на 30°C :

- а. В 64 раза
- б. В 16 раз;
- в. В 24 раза;
- г. В 32 раза;
- д. В 48 раз

вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	а	в	г	а	б	Г	Д	А	в	б

Тема 10. Коллоидная химия как наука. Природа, классификация и общие свойства дисперсных систем

1. Установите соответствие

- | | |
|-------------------|---|
| 1. когезия- это | A. сцепление одинаковых по составу и свойствам частиц |
| 2. адгезия- это | |
| 3. аутогезия- это | |

- Б. связь между молекулами внутри тела в пределах одной фазы
- 2 Установите соответствие**
1. дисперсионная среда газообразная
 2. дисперсионная среда жидккая
- A. эмульсия
- 3.Установите соответствие**
- 1.к основным поверхностным явлениям относятся:
 2. особенности дисперстных систем
 3. основными особенностями свойств студней являются
- 4. Установите соответствие**
- 1.критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) – это концентрация, при которой
 2. коагуляция – это
 - 3.лептизация – это
- 5. Установите соответствие**
1. лиофобные золи
 2. микрогетерогенные системы
 3. грубодисперстные системы
- 6. Поверхность называют**
1. лиофильной, если краевой угол (θ)
 2. лиофобной, если краевой угол (θ)
- a) $\theta < 180^\circ$
- 7.**
1. концентрационная коагуляция
 2. гомокоагуляция
 3. гетерокоагуляция
- A. укрупнение подобных частиц в больший агрегат**
- 8. Установите соответствие**
1. Поверхностно- активные вещества (ПАВ)
 2. Поверхностно- инактивные вещества (ПИВ)
 3. Поверхностно- неактивные вещества (ПНВ)
- 9. Установите соответствие**
1. правило Шилова
 2. правило Дюкло- Траубе
 3. правило Панета- Пескова- Фаянса
- A. поверхностьная активность ПАВ на границе их водных растворов с газом увеличивается в 2-3 раза при увеличении углеводородной цепи**
- 10. Установите соответствие**
1. поверхностное натяжение
 2. поверхностьная активность
 3. адсорбция
- B. соединение приведенных в контакт поверхностей конденсированных фаз
- B. суспензия
- B. аэрозоль
- A. синерезис, «память»
- B. гетерогенность, большая удельная поверхность, количественные характеристики
- B.адгезия, адсорбция, капиллярность
- A.слияние капель дисперстной фазы
- B. образование мицеллы
- B.образование агрегатов из частиц дисперсной фазы под действием различных факторов
- A. более 10^{-3} см
- B. 10^{-7} - 10^{-5} см
- B. 10^{-5} - 10^{-3} см
- б) $\Theta < 90^\circ$
- в) $\theta > 90^\circ$
- г) $\theta = 90^\circ$
- B.взаимная коагуляция разнородных дисперсных систем
- B.вследствие сжатия диффузного слоя противоинов
- A. кислоты, щелочи, соли
- B. спирты, жирные кислоты, амины
- B. сахароза, глюкоза
- B. на поверхности агрегата адсорбируются те ионы, которые близки по своей природе, либо находящиеся в избытке
- B. чем лучше растворитель растворяет вещество, тем хуже вещество адсорбируется из раствора
- A. $\text{Дж}/\text{м}^2$
- B. $\text{моль}/\text{м}^2$
- B. Гиббс

вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	1-в, 2- а, 3-б	1-в, 2- а, б	1-в, 2- б, 3-а	1-б, 2- а, 3-в	1-в, 2- б, 3-а	1-б, 2-в	1-в, 2- а, 3-б	1-б, 2- а, 3-в	1-в, 2- а, 3-б	1-а, 2- б, 3-в

Тема 11. Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных систем.

1. Установите соответствие

1. сталагмометрический метод

2. метод определения адсорбции

3. метод наибольшего давления в пузырьке

А. кондуктометр

2 Установите соответствие

1. Песков Н.П. 1922г.

2. Мишин В.П. 1968г.

3. Сведберг Т. 1905г.

А. получил золи щелочных и щелочноземельных металлов

3. Принцип Ле-Шателье применим к:

а. системам, не изменяющимся во времени;

б. системам, в которых установилось

химическое равновесие;

4. Константа скорости химической реакции не зависит от:

а. природы реагирующих веществ;

б. катализатора;

Б. прибор Ребиндера

В. сталагмометр

Б. ввел в науку понятия кинетической и агрегативной устойчивости

В. ввел в науку понятие конденсационной устойчивости

в. любым системам;

г. системам, изменяющимся во времени.

5. Насыщенным называется раствор:

а. содержащий, максимально возможное количество вещества при данной температуре;

б. в котором больше не растворяется растворенное вещество;

в. находящийся в равновесии с растворенным веществом;

г. который можно считать концентрированным.

6. Устойчивость полимеров зависит:

а. от величины полимера;

в. гидрофобного взаимодействия;

б. от наличия гидратной оболочки;

г. от температуры.

7. Осмос это:

а. явление односторонней диффузии растворителя через полупроницаемую мембрану;

б. явление односторонней диффузии растворенного вещества через проницаемую мембрану;

в. выравнивание концентраций двух растворов.

8. Слабым электролитом называется:

а. слабая кислота;

г. вещество, имеющее степень диссоциации меньше 3%.

б. нерастворимая в воде соль;

в. вещество, имеющее степень диссоциации меньше 100%;

9. Факторы, от которых не зависит константа скорости:

а. природа вещества;

в. температура;

б. природа растворителя;

г. концентрация реагирующих веществ.

10. Под устойчивостью дисперсной системы понимают способность сохранять во времени:

а. средний размер частиц;

в. число электронов;

б. вязкость раствора;

г. температуру раствора.

вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	1-в, 2- а, 3-б в, 3-а	1-б, 2- в, 3-а	б	г	а	б	а	г	г	а

Тема 12. Электрический заряд коллоидных частиц и электрохимические явления.

1. При смешивании растворов хлорида бария и сульфата натрия (избыток) образуются мицеллы следующего строения

а) $[BaSO_4]_m nSO_4^{2-} | (2n-2x)Na^+ | 2xNa^+$

в) $[BaSO_4]_m nBa^{2+} | (2n-2x)Cl^- | 2xCl^-$

б) $[BaCl_2]_m nSO_4^{2-} | (2n-2x)Na^+ | 2xNa^+$

г) $[BaCl_2]_m nBa^{2+} | (n-x)SO_4^{2-} | xSO_4^{2-}$

2. Мицелла гидрозоля имеет следующее строение $[mBaCl_2 nBa^{2+} | (n-x)SO_4^{2-}]_x SO_4^{2-}$

1. хлорид бария

а. потенциалопределяющие ионы

2. сульфат - ионы

б. агрегат

3. ионы бария

в. противоионы диффузионного слоя

3. Какой механизм не осуществляется при образовании двойного электрического слоя:

а. Поверхностная диссоциация;

г. Поверхностная ассоциация;

б. Поверхностная адсорбция;

д. Изоморфное замещение компонентов

в. Ориентация диполей;

твёрдой фазы;

4. Какие слои не характерны для строения мицелл гидрозолей:

а. Диффузный;

б. Дипольный;

в. Адсорбционный;

г. Ван-дер-ваальсовый;

д. Изоэлектрический.

5. Какие составные части коллоидной частицы движутся в электрическом поле:

а. Гранула;

г. Мицелла;

б. Ядро;

д. Диффузный слой;

в. Агрегат;

е. Адсорбционный слой

6. Чем характеризуется изоэлектрическое состояние мицеллы золя:

а. Отсутствием скачка потенциала на границе твердое - жидкость;

в. Отсутствием адсорбционного слоя противоионов;

б. Отсутствием диффузного слоя противоионов;

г. «Отрывом» диффузного слоя;

д. Наличием только слоя Штерна.

7. Какие типы ионов и молекул склонны к специфической адсорбции:

а. Гидратированные ионы;

г. Ионы, изоморфные ионам

б. Макромолекулы ПАВ;

криSTALLлической решетки;

в. Многозарядные ионы;

д. Алкалоиды;

е. Красители.

8. Установите соответствие:

Технологический процесс	Электрокинетическое явление
А) Транспортировка жидкостей по трубопроводам;	1) Электрофорез
Б) Осаждение эмульсий и суспензий;	2) Электроосмос
В) Осушение грунтов;	3) Эффект Дорна
Г) Нанесение защитных покрытий на различные поверхности.	4) Эффект Квинке

9. Мерой интенсивности электрокинетических явлений служит:

а. Толщина диффузного слоя;

в. Величина ζ -потенциала;

б. Величина термодинамического

г. Приведенная толщина диффузного слоя;

потенциала;

д. Абсолютная величина заряда гранулы.

10. Установите соответствие:

Содержание понятия	Электрокинетическое явление
А) Появление скачка потенциала при оседании тонкодисперсных частиц.	1) Электрофорез
Б) Движение частиц дисперсной фазы под действием электрического поля.	2) Электроосмос
В) Движение частиц дисперсионной среды под действием электрического поля.	3) Эффект Дорна
Г) Появление скачка потенциала при продавливании жидкости через пористую поверхность или капилляр.	4) Эффект Квинке

вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	а	1-б, 2-в, 3-а	А,Д	Г	Д,Б	А	Г	А-3 Б-4 В-1 Г-2	А	А-4 Б-1 В-3 Г-2

Тема 13. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем

1. Электроосмос - это

а) перемещение частиц дисперсной фазы относительно дисперсионной среды под действием приложенной разности потенциалов

б) перемещение дисперсионной среды в пористом теле под действием приложенной разности потенциалов

в) появление разности потенциалов при течении дисперсионной среды под действием перепада давлений через пористое тело

г) появление разности потенциалов при седиментации частиц дисперсной фазы под действием силы тяжести

2. Агрегативно устойчивой является такая дисперсная система, частицы которой

а) не оседают

г) не образуют агрегатов

б) оседают

д) участвуют в броуновском движении

в) образуют агрегаты

е) не участвуют в броуновском движении

3. Кинетическая седиментационная устойчивость зависит от

- а) вязкости дисперсионной среды
 б) поверхностного натяжения дисперсионной среды
 в) размера частиц
 г) наличия двойного электрического слоя
- д) плотности дисперсионной среды
 е) плотности дисперсной фазы
 ж) величины электрокинетического потенциала

4. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) – это концентрация, при которой

- а) раствор ПАВ становится лиофильной дисперсной системой
 б) начинается быстрая коагуляция
 в) сферические мицеллы становятся цилиндрическими
 г) начинают образовываться мицеллы

5. Что подразумевают под устойчивостью дисперсных систем:

- а) Постоянство их свойств во времени;
 б) Устойчивость по отношению к укрупнению или агрегации частиц дисперсной фазы;
 в) Постоянство распределения частиц дисперсной фазы по объему;
 г) Устойчивость к осаждению частиц дисперсной фазы.

6. Какие виды устойчивости дисперсных систем выделены по предложению Н. П.Пескова:

- а) Устойчивость к слипанию частиц – коагуляционная устойчивость;
 б) Устойчивость к объединению частиц дисперсной фазы – агрегативная устойчивость;
 в) Устойчивость к разделению фаз – седиментационная (кинетическая) устойчивость;
 г) Устойчивость к осаждению дисперсной фазы – диспергационная устойчивость.

7. По А. П. Ребиндеру различают:

- 1) – Термодинамически устойчивые системы, образующиеся при самопроизвольном диспергировании, - лиофильные системы;
 2)- Термодинамически неустойчивые дисперсные системы, обладающие различной кинетической устойчивостью к агрегации частиц, - лиофобные системы.

К какому виду систем принадлежат предлагаемые объекты?

- а) Молоко;
 б) Желатина;
 в) Рубиновое стекло;
 г) Крахмал;
 Д) Сырая нефть.

8. Укажите факторы кинетической устойчивости золей.

- а) Дисперсность системы;
 б) Вязкость среды;
 в) Присутствие в растворе посторонних веществ (электролитов или ВМС);
 г) Разность плотностей дисперсионной среды и дисперсной фазы.

9. Укажите факторы агрегативной устойчивости золей.

- а) Броуновское движение;
 б) Температура;
 в) Дисперсность;
 г) Присутствие в растворе посторонних веществ (электролитов или ВМС).

10. Какие определения не соответствуют содержанию понятия «коагуляция»?

- а) Процесс укрупнения мицелл золя за счет соединения друг с другом;
 б) Процесс всплытия створженной дисперсной фазы;
 в) Процесс слипания мицелл золя под влиянием внешнего воздействия;
 г) Явление прохождения через поры фильтра свежеосажденного осадка при промывании большим количеством воды.

вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	б	г	АВДЕ	А	А	В	1-б,г 2-а,в	Г	А	а

Тема 14. Разные классы коллоидных систем**1. Установите соответствие**

- | | |
|--|-----------------|
| 1. дисперсная фаза- жидкость | а) дым, пыль |
| 2. дисперсная фаза- твердое тело | б) смог |
| 3. дисперстная фаза- твердое тело и жидкость | в) туман, капли |

2. Установите соответствие

- | | |
|----------|---|
| 1. песок | а) диаметр дисперсной фазы - $2 \cdot 10^{-5}$ - $2 \cdot 10^{-3}$
м |
| 2. пыль | б) диаметр дисперсной фазы $< 2 \cdot 10^{-6}$ |
| 3. пудра | в) диаметр дисперсной фазы- $2 \cdot 10^{-6}$ - $2 \cdot 10^{-5}$ |

3. Для суспензий характерны свойства:

- а) термофорез и термопреципитация;
- б) фосфоресценция, термофорез и термопреципитация;
- в) флуоресценция, фосфоресценция, термофорез и термопреципитация;
- г) флуоресценция и фосфоресценция.

4. При добавлении пенообразователя, пена быстро достигает максимума, а при дальнейшем его добавлении практически не образуется. К какому типу относятся такие пенообразователи:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| а) средней эффективности | б) низкой эффективности |
| в) высокой эффективности | г) не обладают эффективностью. |

5. Свойство желатинообразование характерно для:

- | | |
|-------------|---------------|
| а) эмульсий | б) суспензий |
| в) пен | г) аэрозолей? |

6. Сопоставьте свойства систем и системы:

- | | |
|------------------------|--------------|
| А) кратность | 1. суспензии |
| Б) коагуляция | 2. эмульсии |
| В) фосфоресценция | 3. пены |
| Г) термофорез | 4. аэрозоли |
| Д) высота столба | |
| Е) время существования | |
| Ж) флуоресценция | |

7. Суспензии получают следующими способами:

- а) диспергационным и конденсационным физическим и химическим;
- б) конденсационным химическим и физическим;
- в) диспергационным и конденсационным химическим;
- г) диспергационным и физическим.

8. Содержание дисперсной фазы в разбавленных эмульсиях составляет:

- а) 0,1%;
- б) 7,4%;
- в) 74%;
- г) 50%.

9. Для разбавленных эмульсий 2-го рода характерны свойства:

- а) термофорез и термопреципитация;
- б) фосфоресценция, термофорез и термопреципитация;
- в) флуоресценция, фосфоресценция, термофорез и термопреципитация;
- г) флуоресценция и фосфоресценция.

10. Для аэрозолей характерны свойства:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| а) высокая седиментация; | г) броуновское движение; |
| б) слабый электрофорез; | д) слабая диффузия. |
| в) сильный электрофорез; | |

вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	1-в, 2-а, 3-б	1-а, 2-в, 3-б	А	Г	В	1-а, е 2-г, ж 3-б 4-в, д	Г	А	В	Г, д

2.2 Перечень тем презентаций для текущего контроля успеваемости (по выбору преподавателя)

Тема 1. Предмет, задачи и методы физической и коллоидной химии и ее значение для фармации.

1. Н.С. Курнаков – основатель физико-химического анализа
2. Н.Н. Бекетов – основоположник физической химии
3. Вклад В.Ф. Алексеева в развитие физической химии
4. Т. Грэм и И.Г. Борщов – основатели коллоидной химии

5. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии коллоидной химии (А.В. Думанский, В. Оствальд, П.А. Ребиндер)

6. Значение коллоидной химии в развитии фармации

Тема 2. Основные понятия и законы химической термодинамики и термохимии.

1. Азеотропы

2. Условия равновесия поверхностного слоя с объемными фазами. Энергия поверхностного слоя. Поверхностное натяжение.

3. Поверхностные явления. Адгезия и когезия. Смачивание и несмачивание. Уравнения Юнга и Дюпре-Юнга.

4. Капиллярные явления. Дисперсность и реакционная способность.

5. Адсорбция. Основные понятия и определения. Уравнение для расчета энергии Гиббса поверхностного слоя.

Тема 3. Термодинамика химического равновесия

1. Ректификация

2. Ионные слои как фактор устойчивости коллоидных систем. Строение мицеллы лиофобного золя. Электрокинетический потенциал.

3. Влияние температуры, природы растворителя, добавок электролитов на агрегативную устойчивость золей.

4. Индифферентные электролиты. Влияние добавок индифферентных электролитов на распределение потенциала в ДЭС и агрегативную устойчивость золей. Адсорбционная перезарядка.

Тема 4. Термодинамика фазовых равновесий

1. Коагуляция лиофобных золей. Закономерности электролитной коагуляции. Правило Шульце-Гарди. Лиотропные ряды.

2. Кинетика коагуляции. Основные закономерности. Скорость коагуляции.

3. Теория быстрой коагуляции Смолуховского. Период коагуляции.

4. Теория медленной коагуляции Фукса.

Тема 5. Термодинамика разбавленных растворов.

1. Классификация буферных систем и растворов. Значение буферных систем для химии и биологии.

2. Эмульсии и их классификация. Определение типа эмульсии. Устойчивость эмульсий. Эмульгаторы и механизм их действия. Обращение фаз эмульсий. Методы получения эмульсий. Пены.

3. Мицеллярные коллоидные системы. Критическая концентрация мицеллообразования. Солюбилизация.

4. Молекулярные коллоидные системы. Классификация ВМС. Молекулярная масса ВМС.

Тема 6. Термодинамика растворов электролитов.

1. Коагуляция смесью электролитов.

2. Капиллярные явления. Дисперсность и реакционная способность.

3. Адсорбция. Основные понятия и определения. Уравнение для расчета энергии Гиббса поверхностного слоя.

4. Природа сил, обуславливающих адсорбционные взаимодействия. Химическая и физическая адсорбция.

Тема 7. Термодинамика поверхностных явлений

1. Поверхностные явления. Адгезия и когезия. Смачивание и несмачивание.

2. Капиллярные явления. Дисперсность и реакционная способность.

3. Адсорбция. Основные понятия и определения.

4. Природа сил, обуславливающих адсорбционные взаимодействия. Химическая и физическая адсорбция.

5. Метод Гиббса и метод полного содержания. Понятие полных и избыточных адсорбций и их взаимосвязь.

Тема 8. Электрохимия

1. Электродные потенциалы

2. Ионоселективные электроды. Применение в биологии, медицине, фармации. Стеклянный электрод

3. Потенциометрическое титрование. Значение этого метода в фармацевтической практике

Тема 9. Кинетика химических реакций и катализ

1. Ускоренные методы определения сроков годности лекарственных препаратов
2. Цепные реакции
3. Развитие учения о катализе (А.А. Баландин, Н.И. Кобозев)

Тема 10. Коллоидная химия как наука. Природа, классификация и общие свойства дисперсных систем

1. Аэрозоли и их свойства. Применение аэрозолей в фармации
2. Порошки и их свойства. Применение в фармации
3. Суспензии и их свойства. Применение в фармации
4. Пены. Пасты
5. Эмульсии и их свойства. Применение в фармации

Тема 11. Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных систем.

1. Закон фотохимической эквивалентности Эйнштейна
2. Иониты и их классификация. Применение ионитов в фармации
3. Применение хроматографии для получения и анализа лекарственных веществ
4. Гель-фильтрация

Тема 12. Электрический заряд коллоидных частиц и электрохимические явления

1. Электрофорез. Электрофоретические методы исследования в фармации. Практическое применение электроосмоса в фармации
2. Коагервация. Гелеобразование и студнеобразование, влияние различных факторов на эти процессы.
3. Свойства гелей и студней. Синерезис

Тема 13. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем

1. Специфические особенности дисперсных систем. Классификация дисперсных систем.
2. Характеристика свойств дисперсных систем и особенности их поведения. Молекулярно-кинетические свойства и оптические свойства дисперсных систем.
3. Седиментационно-диффузионное равновесие. Гипсометрическая высота как критерий кинетической устойчивости.
4. Условия равновесия поверхности слоя с объемными фазами. Поверхностное натяжение

Тема 14. Разные классы коллоидных систем


1. Солюбилизация и ее значение в фармации
2. Мицеллярные коллоидные системы в фармации
3. Высокомолекулярные соединения и их растворы. Применение в фармации
4. Полиамфолиты и их свойства. Полиэлектролиты и их свойства
5. Синерезис
6. Седиментация и ее применение для исследования коллоидных систем

Темы презентаций могут быть предложены преподавателем из выше перечисленного списка, а также обучающимся в порядке личной инициативы по согласованию с преподавателем

2.3. Перечень ситуационных задач для текущего контроля успеваемости

Тема 1. Предмет, задачи и методы физической и коллоидной химии и ее значение для фармации.

Задача 1. Вычислите ΔH° , ΔU° , ΔG° и ΔA° для реакции



Определите, возможно ли самопроизвольное протекание реакции при стандартных условиях.

Решение: Воспользовавшись данными, приведенными в Приложении, рассчитаем тепловой эффект реакции при постоянном давлении:

$$\begin{aligned}\Delta H_r^\circ &= \sum n_i \Delta H_{f\text{prod}}^\circ - \sum n_i \Delta H_{f\text{исх}}^\circ = \\ &= 2\Delta H_f^\circ \text{CO} + \Delta H_f^\circ \text{O}_2 - 2\Delta H_f^\circ \text{CO}_2 = \\ &= [2(-110,70) + 0] - 2(-393,51) = 565,62 \text{ кДж/моль.}\end{aligned}$$

Изменение внутренней энергии связано с изменением энталпии зависимостью:

$$\Delta H_r^\circ = \Delta nRT,$$

$$\Delta U_r^\circ =$$

где: Δn – изменение числа молей газообразных веществ в ходе реакции,

$$\Delta n = 3 - 2 = 1;$$

R – универсальная газовая постоянная ($8,314 \times 10^{-3}$ кДж/моль•К);

$$T = 298 \text{ K.}$$

Следовательно:

$$\Delta U_r^0 = 565,62 - 8,314 \times 10^{-3} \cdot 298 = 563,14 \text{ кДж/моль.}$$

Для расчета ΔG_r^0 найдем предварительно изменение энтропии:

$$\begin{aligned}\Delta S_r^0 &= S_{\text{CO}}^0 + S_{\text{O}_2}^0 - 2S_{\text{CO}_2}^0 = \\ &= (2 \times 197,48 + 205,03) - 2 \times 213,66 = 172,67 \text{ Дж/моль}\cdot\text{К.}\end{aligned}$$

Тогда изменение энергии Гиббса будет равно:

$$\Delta G_r^0 = \Delta H_r^0 - T\Delta S_r^0 = 565,62 - 298 \cdot 172,67 \times 10^{-3} = 514,16 \text{ кДж/моль.}$$


Теперь определим изменение энергии Гельмгольца:

$$\Delta A_r^0 = \Delta U_r^0 - T\Delta S_r^0 = 563,14 - 298 \cdot 172,67 \times 10^{-3} = 511,68 \text{ кДж/моль}$$

Положительные значения величин ΔG_r^0 и ΔA_r^0 указывают на то, что при стандартных условиях реакция не будет самопроизвольно идти в прямом направлении.

Тема 2. Основные понятия и законы химической термодинамики и термохимии.

Задача 2. Для реакции крекинга метана



Используя данные Приложения, рассчитать ΔG_{r298}^0 и ΔA_{r298}^0 . Определить, возможно ли самопроизвольное протекание данной реакции при температуре 298 К.

Решение:

1) Воспользовавшись данными Приложения

$$(\Delta G_f^0)_{\text{CH}_4(\text{r})} = -50,85; \Delta G_f^0 \text{ C}(\text{t}) = 0; \Delta G_f^0 \text{ H}_2(\text{r}) = 0 \text{ кДж/моль},$$

рассчитаем ΔG_r^0 (изменение энергии Гиббса)

$$\begin{aligned}\Delta G_r^0 &= \sum n_i \Delta G_f^0 \text{ продукт.} - \sum n_i \Delta G_f^0 \text{ исх.} = \Delta G_f^0 \text{ C}(\text{t}) + 2 \Delta G_f^0 \text{ H}_2(\text{r}) - \Delta G_f^0 \text{ CH}_4(\text{r}) = \\ &= 0 + 2 \cdot 0 - (-50,85) = +50,85 \text{ кДж}\end{aligned}$$

2) Для расчета ΔA_r^0 воспользуемся соотношением между ΔG_r^0 и ΔA_r^0 :

$$\Delta A_r^0 = \Delta G_r^0 - \Delta nRT,$$

где Δn – изменение числа молей газообразных веществ в ходе реакции,

R – универсальная газовая постоянная

Находим Δn : $\Delta n = \sum n_{\text{прод.}} - \sum n_{\text{исх.}} = 2 - 1 = 1$


Отсюда:

$$\Delta A_r^0 = 50,89 - 1 \cdot 8,314 \cdot 10^{-3} \cdot 298 = 48,41 \text{ кДж},$$

т.к. ΔG_{r298}^0 и $\Delta A_{r298}^0 > 0$, то при 298 К невозможно самопроизвольное протекание данной реакции в прямом направлении.

Тема 2. Основные понятия и законы химической термодинамики и термохимии.

Задача 3. Для реакции крекинга метана



Рассчитать ΔH_r^0 , используя значение стандартных теплот сгорания веществ (лДж/моль): $\Delta H_c^0 \text{ CH}_4(\text{r}) = -890,31$; $\Delta H_c^0 \text{ C}(\text{t}) = -393,51$; $\Delta H_c^0 \text{ H}_2(\text{r}) = -285,84$

Определить экзо- или эндотермической является данная реакция.

Решение: В соответствии со следствием закона Гесса:

$$\begin{aligned}\Delta H_r^0 &= \sum n_i \Delta H_c^0 \text{ исх.} - \sum n_i \Delta H_c^0 \text{ прод.} = \\ &= \Delta H_c^0 \text{ CH}_4(\text{r}) - (\Delta H_c^0 \text{ C}(\text{t}) + 2 \Delta H_c^0 \text{ H}_2(\text{r})) = \\ &= -890,31 - [-393,51 + 2 \cdot (-285,84)] = +74,88 \text{ кДж}\end{aligned}$$

т.к. $\Delta H_r^0 > 0$, реакция является эндотермической.

Тема 2. Основные понятия и законы химической термодинамики и термохимии.

Задача 4. Напишите уравнение реакции сгорания метана. Вычислите стандартную теплоту образования метана, если его стандартная теплота сгорания


$$\Delta H_c^0 = -890,31 \text{ кДж/моль}$$

Продукты сгорания имеют следующие теплоты образования (кДж/моль)

$$\Delta H_f^0 \text{ CO}_2(\text{r}) = -393,51; \Delta H_f^0 \text{ H}_2\text{O}(\text{ж}) = -285,84$$

Решение:

Напишите термохимическое уравнение реакции сгорания метана




В соответствии со следствием закона Гесса:

$$\begin{aligned} \Delta H^\circ_r &= \sum n_i \Delta H_f^0_{\text{прод.}} - \sum n_i \Delta H_f^0_{\text{исх.}} = \\ &= (\Delta H_f^0_{\text{CO}_2\text{(r)}} + 2 \Delta H_f^0_{\text{H}_2\text{O}\text{(ж)}}) - (\Delta H_f^0_{\text{CH}_4\text{(r)}} + 2 \cdot \Delta H_f^0_{\text{O}_2\text{(r)}}) \\ \text{С другой стороны: } \Delta H^\circ_r &= \Delta H_f^0_{\text{CH}_4\text{(r)}} \\ \text{Тогда: } \Delta H_f^0_{\text{CH}_4\text{(r)}} &= (\Delta H_f^0_{\text{CO}_2\text{(r)}} + 2 \Delta H_f^0_{\text{H}_2\text{O}\text{(ж)}}) - (\Delta H_f^0_{\text{CH}_4\text{(r)}} + 2 \Delta H_f^0_{\text{O}_2\text{(r)}}); \\ -890,31 &= (-393,51 + 2 \cdot (-285,84)) - (\Delta H_f^0_{\text{CH}_4\text{(r)}} + 2 \cdot 0); \\ -890,31 &= -393,51 - 571,68 - \Delta H_f^0_{\text{CH}_4\text{(r)}} \\ \Delta H_f^0_{\text{CH}_4\text{(r)}} &= -74,88 \text{ кДж/моль.} \end{aligned}$$

Тема 2. Основные понятия и законы химической термодинамики и термохимии.

Задача 5. Используя уравнение Кирхгоффа для небольшого температурного интервала рассчитать тепловой эффект реакции



при температуре 500К и давлении $1,0133 \times 10^5$ Па.

Решение: По данным приложения сначала рассчитываем тепловой эффект реакции при 298К:

$$\begin{aligned} \Delta H^\circ_{r298} &= (\Delta H_f^0_{\text{CO}_2} + 2 \Delta H_f^0_{\text{H}_2\text{O}}) - (\Delta H_f^0_{\text{CH}_3\text{OH}} + 3/2 \Delta H_f^0_{\text{O}_2}) = \\ &= (-393,51 - 2 \times 241,8) - (-201,00 + 3/2 \times 0) = -676,13 \text{ кДж/моль.} \end{aligned}$$

Зная ΔH°_{r298} , можно по уравнению Кирхгоффа рассчитать тепловой эффект реакции при 500К:

$$\Delta H^\circ_{rT2} = \Delta H^\circ_{rT1} + \Delta C_p^o(T_2 - T_1)$$

где ΔC_p^o – изменение теплоемкости в ходе реакции. Его можно определить таким образом:


$$\begin{aligned} \Delta C_p^o &= \sum n_i C_{pi\text{prod.}} - \sum n_i C_{pi\text{исх.}} = \\ &= (C_{p\text{CO}_2}^o + 2C_{p\text{H}_2\text{O}}^o) - (C_{p\text{CH}_3\text{OH}}^o - 3/2 C_{p\text{O}_2}^o) = \\ &= (37,11 + 2 \times 33,56) - (43,9 - 3/2 \times 28,83) = 17,10 \text{ Дж/моль}\cdot\text{К} \end{aligned}$$

и значит, тепловой эффект реакции при 500К равен:

$$\begin{aligned} \Delta H^\circ_{r500} &= \Delta H^\circ_{r298} + \Delta C_p^o(500 - 298) = \\ &= -676130 + 17,1 \times 202 = -672676 \text{ Дж/моль} = -672,676 \text{ кДж/моль.} \end{aligned}$$

Тема 2. Основные понятия и законы химической термодинамики и термохимии.

Задача 6. Значение стандартной энергии Гиббса ΔG°_r реакции



равно $-3,434$ кДж/моль. Вычислите константы равновесия K_p и K_c . Каков будет состав равновесной реакционной смеси, если в реакцию введены 1 моль кислоты и 2 моля спирта?

Решение: Воспользуемся соотношением $\Delta G^\circ_r = -RT\ln K_p$, из которого получаем

$$\begin{aligned} \Delta G^\circ_r &= -3,434 \\ \ln K_p &= -\frac{\Delta G^\circ_r}{RT} = -\frac{-3,434}{8,314 \times 10^{-3} \times 298} = 1,386 \\ \text{и значит } K_p &= e^{1,386} = 3,9989 \approx 4. \end{aligned}$$

$K_c = K_p(RT)^{-\Delta n}$, а так как $\Delta n = 2 - 2 = 0$, то $K_c = K_p = 4$.

Для того, чтобы ответить на вопрос о составе равновесной реакционной смеси, необходимо в общем виде проанализировать начальный и равновесный состав реакционной смеси:

	CH_3COOH	$+$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$=$	$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$	$+$	H_2O	
Исходный состав, моль	1		2		0		0	
Равновесный состав, моль	$1-x$		$2-x$		x		x	

Выразим константу равновесия через равновесные количества молей веществ:

$$K_c = \frac{x \cdot x}{(1-x)(2-x)} = 4$$

и решим уравнение относительно x :

$$x^2 = (1-x)(2-x) = 4; \quad x^2 = (2-3x+x^2) = 4; \quad x^2 = 8 - 12x + 4x^2; \quad 3x^2 - 12x + 8 = 0$$

$D = \sqrt{144 - 96} = 6,928$; и значит

$$x_1 = \frac{12 + 6,928}{6} = 3,15 \text{ моля}; \quad x_2 = \frac{12 - 6,928}{6} = 0,845 \text{ моля.}$$

значение $= 3,15$ мол. x_1 не имеет физического смысла (так как из 2 молей спирта нельзя получить 3 моля этилацетата) и отбрасывается. Таким образом, состав реакционной смеси при равновесии будет следующим:

уксусной кислоты: $1 - 0,845 = 0,155$ моля,

спирта: $2 - 0,845 = 1,155$ моля,

этилацетата: $0,845$ моля,

воды: $0,845$ моля.

Тема 3. Термодинамика химического равновесия

Задача 7. Выразите известным вам способом концентрацию раствора 10 г NaCl в 100 мл (г) воды. В качестве способов выражения концентрации используйте:

- 1) молярную весовую концентрацию (моляльность);
- 2) молярную объемную концентрацию (молярность);
- 3) нормальность (молярную концентрацию эквивалента);
- 4) моляльную (молярную) долю;
- 5) титр;
- 6) весовой процент;
- 7) число граммов растворенного вещества на 100 г растворителя (коэффициент растворимости при данных условиях).

Решение:

Обозначение	Название и определение
C_m	Молярная весовая концентрация (моляльность) - число молей растворённого вещества, приходящееся на 1000 г растворителя.
C_M	Молярная объёмная концентрация (молярность) - число молей растворённого вещества, содержащееся в 1 литре раствора.
$C_{n(h.)}$	Нормальность - число грамм-эквивалентов растворённого вещества, содержащееся в 1 литре раствора.
N	Мольная (или молярная) доля - число молей растворённого вещества, приходящееся на 1 моль раствора.
T	Титр - число граммов растворённого вещества, содержащееся в 1 мл раствора.
P	Весовой процент - число граммов растворённого вещества, содержащееся в 100 г раствора.
A	Число граммов растворённого вещества, приходящееся на 100 г растворителя.

Если обозначить:

\mathcal{E} - эквивалентный вес растворённого вещества;

M - молекулярный вес растворённого вещества;

M_p - молекулярный вес растворителя;

n - число грамм-эквивалентов в 1 моль растворённого вещества;

p - плотность раствора, то:

$$\mathfrak{n}_{\text{NaCl}} = \frac{m_{\text{NaCl}}}{M_{\text{NaCl}}} = 10/23 + 35.5 = 0.17 \text{ моля};$$

$$n_{\text{NaCl}} \cdot m'_{\text{H}_2\text{O}} (1000 \text{ г}) \quad 0.17 \cdot 1000$$

$$1) C_m = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{NaCl}} \cdot 1000 \text{ мл}} = \frac{100}{0.17 \cdot 1000} = 1,7 \text{ моль}/1000 \text{ г};$$

$$2) C_M = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{100 \text{ мл} (V_{\text{H}_2\text{O}})} = \frac{100}{100} = 1,7 \text{ моль}/\text{л}$$

$$3) C_N = \frac{T \cdot 1000}{\mathcal{E}} = ; C_N = 1,7 \text{ г экв/л}$$

также возможен расчет нормальности раствора по следующей формуле:

$$C_N = \frac{m \cdot X}{\mathcal{E} \cdot 100}, \text{ где}$$

m – масса, г; X - массовая доля, %; \mathcal{E} - эквивалентная масса, г/г-экв.

$$4) N = \frac{n_{NaCl} \cdot n'_{H_2O} (1 \text{ моль})}{n_{p-pa}} = \frac{0.17 \cdot 1}{5+0.17}; n_{p-pa} = n_{NaCl} + n_{H_2O}; N = 0,033$$

$$5) T = \frac{m_{NaCl} \cdot V'_{H_2O} (1 \text{ мл})}{V_{H_2O}} = \frac{10 \cdot 1}{100}; T = 0,1 \text{ г/мл}$$

$$6) P = \frac{m_{NaCl}}{m_{H_2O} + m_{NaCl}} = \frac{10}{100+10}; P = 9,09 \%$$

$$7) A = m_{NaCl} / m'_{H_2O}; A = 0,1 \text{ г/100 г воды}$$

Тема 5. Термодинамика разбавленных растворов.

Задача 8. В 100 г воды растворено 1,53 г глицерина. Давление пара воды при 298К равно 3167,2 Н/м². Вычислите: а) понижение давления пара воды над раствором; б) температуру кипения раствора; в) температуру его замерзания; г) его осмотическое давление.

Решение:

а) В соответствии с законом Рауля относительное понижение давления равновесного с раствором пара равно:

$$\frac{p^0 - p}{p^0 p^0} = \frac{\Delta p}{p^0} = X_{gl},$$

где X_{gl} – мольная доля глицерина в растворе.

$X_{gl} = n_{gl} / (n_{gl} + n_{воды})$, где n – количество вещества (моль).

$n_{воды} = 100 / 18 = 5,555$ моль; $n_{gl} = 1,53 / 92 = 0,017$ моль;

Значит, $X_{gl} = 0,017 / (0,017 + 5,555) = 0,003$,

и тогда $\Delta p / 3167,2 = 0,03$; $\Delta P = 95,02$ Па.

б) Повышение температуры кипения раствора неэлектролита можно вычислить по эбуллиоскопической формуле:

$$\Delta T_{кип} = \frac{K_s m \cdot 1000}{M a},$$

где K_s – эбуллиоскопическая константа растворителя (для воды она равна 0,52); m – масса растворенного вещества в граммах; M – его молярная масса; a – масса растворителя в граммах. Отсюда

$$\Delta T_{кип} = \frac{0,52 \times 1,53 \times 1000}{92 \times 100} = 0,086^\circ.$$

Следовательно, температура кипения раствора будет равна 100,086⁰С.

в) Понижение (депрессия) температуры замерзания раствора рассчитывается по криоскопической формуле:

$$\Delta T_{зам} = \frac{K_k m}{M_a} \cdot 1000$$

где K_k – криоскопическая константа растворителя (для воды 1,86):

$$\Delta T_{зам} = \frac{1,86 \cdot 1,53 \cdot 1000}{92 \cdot 100} = 0,309^0$$

Следовательно, раствор будет замерзать при –0,309⁰С.

г) в соответствии с законом Вант–Гоффа осмотическое давление в растворах неэлектролитов можно рассчитать по уравнению

$$\pi = CRT,$$

где С – молярная концентрация раствора.

При пересчете в систему СИ концентрация должна быть выражена в моль/м³. Считая плотность раствора равной плотности воды, получим:

$$C = \frac{1,53 \cdot 1000}{90 \cdot 100} = 0,17 \text{ моль/л} = 0,17 \times 10^3 \text{ моль/м}^3.$$

Тогда

$$\pi = 0,17 \times 10^3 \cdot 8,314 \cdot 298 = 421187,2 \text{ Па} (\approx 4,2 \text{ атм}).$$

Тема 5. Термодинамика разбавленных растворов.

Задача 9.

Рассчитайте осмотическое давление водного раствора хлорида кальция с концентрацией 0,05 моль/л при температуре 37⁰С. Степень диссоциации (ионизации) CaCl₂ равна 97%. Каким этот раствор является по отношению к плазме крови: гипо-, гипер- или изотоническим?

Решение:

Осмотическое давление растворов электролитов рассчитывается по уравнению Вант - Гоффа:

$$\pi_{осм} = iCRT,$$

где i - изотонический коэффициент Вант – Гоффа

C – концентрация раствора (моль/л, моль/м³)


R – универсальная газовая постоянная

T – температура, К

Расчет i : $i = 1 + \alpha(v - 1)$,

где α - кажущаяся степень диссоциации электролита

v - число частиц (ионов), на который диссоциирует молекула



$$(v = 3); \quad i = 1 + 0,97(3 - 1) = 1 + 1,94 = 2,94$$

$$\pi_{осм} = iCRT = 2,94 \cdot 0,05 \cdot 0,082 \cdot 310 = 3,74 \text{ атм.}$$

$$\text{или: } \pi_{осм} = 2,94 \cdot 0,05 \cdot 10^3 \cdot 8,314 \cdot 310 = 378868,98 \text{ па}$$

т.к. $\pi_{осм}$ р. CaCl₂ = 3,74 атм < $\pi_{осм}$ плазмы крови (7,6 атм)

Следовательно этот раствор гипотонический.

Тема 5. Термодинамика разбавленных растворов.

Задача 10. Рассчитайте количество водяного пара, необходимого для перегонки 10 кг анилина, если смесь анилина с водой при атмосферном давлении кипит при 98,4⁰С. При этой температуре давление водяного пара равно 94605 Па.

Решение. Коэффициент расхода пара m_p/m_a при перегонке с водяным паром рассчитывается по уравнению:

$$\frac{m_b p_b M_b}{m_a p_a M_a} = \dots$$

где m_b и m_a – массы воды и анилина, M_b и M_a – молярные массы воды и анилина; p_b и p_a – парциальные давления паров воды и анилина при температуре перегонки.

p_a находится с помощью закона Дальтона как разность между нормальным атмосферным давлением и p_b :

$$p_a = 101325 \text{ Па} - 94605 \text{ Па} = 6720 \text{ Па.}$$

Отсюда:

$$\frac{m_b 94605 \bullet 18}{m_a 6720 \bullet 931} = \frac{2,72}{\dots} = 2,72$$

Следовательно, для перегонки 1 кг анилина требуется 2,72 кг водяного пара, а для 10 кг анилина его понадобится 27,2 кг.

Тема 5. Термодинамика разбавленных растворов.

Задача 11. Раствор, содержащий 0,8718 моль/л тростникового сахара, при $T = 291\text{K}$, изотоничен с раствором хлорида натрия, содержащим 0,5 моль/л NaCl . Рассчитайте: а) изотонический и осмотический коэффициенты для хлорида натрия; б) кажущуюся степень его диссоциации.

Решение:

а) Для раствора сахара осмотическое давление рассчитывается по уравнению Вант-Гоффа для неэлектролитов: $\pi_1 = C_1 RT$; а для раствора NaCl по уравнению для электролитов: $\pi_2 = iC_2 RT$, где i – изотонический коэффициент. Так как осмотические давления растворов равны, т.е. $\pi_1 = \pi_2$, и значит $C_1 RT = iC_2 RT$.

$$\text{Отсюда } i = C_1/C_2 = 0,8718/0,5 = 1,7436.$$

По величине изотонического коэффициента рассчитываем осмотический коэффициент g :

$$g = i/v = 1,7436/2 = 0,8718,$$

где v – число ионов, образующихся при диссоциации одной молекулы.

б) Кажущуюся степень диссоциации α вычисляем с помощью уравнения, связавшего ее с изотоническим коэффициентом:

$$i = 1 + \alpha(v - 1);$$

$$\text{Отсюда } \alpha = (i - 1)/(v - 1) = (1,7436 - 1)/(2 - 1) = 0,7436.$$

Задача 12. Для предотвращения частичного разложения лекарственного препарата в кипящем водном растворе при отгонке воды необходимо понизить температуру кипения на 20° . Вычислите, какое давление при этом надо поддерживать в перегонном аппарате. Теплота испарения воды 40660 Дж/моль.

Решение: Используем для расчета уравнение Клапейрона–Клаузиуса:

$$\ln \frac{p_2 \Delta H_{\text{исп.}}}{p_1 R T_1 \bullet T_2} = \frac{(T_2 - T_1)}{\dots}$$

Считая, что температура кипения раствора T_2 при нормальном атмосферном давлении $p_2=101325$ Па равна 100°C (373K), подставим значения:

$$\ln \frac{10132540660(373 - 353)}{p_1 8,314 \bullet 353 \bullet 373} = 0,7428.$$

отсюда $\ln p_1 = \ln 101325 - 0,7428 = 11,5261 - 0,7428 = 10,7832$,
и значит, требуемое давление $p_1 = e^{10,7832} = 48204 \text{ Па (0,47 атм.)}$.

Тема 5. Термодинамика разбавленных растворов.

Задача 13. Рассчитайте объемы 0,1 М растворов уксусной кислоты и ацетата натрия, необходимые для приготовления 20 мл ацетатного буферного раствора с $\text{pH} = 4$.

Решение. Так как концентрации растворов одинаковы, расчет ведется по уравнению:

$$pH = pK_a + \lg \frac{V_{c.o.} C_{c.o.}}{V_{c.k.} C_{c.k.}},$$

где pK_a – показатель кислотности уксусной кислоты, равный 4,74;

$V_{c.o.}$ и $V_{c.k.}$ – соответственно объемы растворов сопряженных основания и кислоты. Отсюда при $C_{c.k.} = C_{c.o.}$:

$$\lg V_{c.o.}/V_{c.k.} = pH - pK_a = 4 - 4,74 = -0,74; V_{c.o.}/V_{c.k.} = 10^{-0,74} = 0,18.$$

Принимая $V_{c.o.} = 20 - V_{c.k.}$, получим $(20 - V_{c.k.})/V_{c.k.} = 0,18$;

откуда объем раствора уксусной кислоты $V_{c.k.} = 16,95$ мл, и объем раствора ацетата натрия $V_{c.o.} = 20 - 16,95 = 3,05$ мл.

Тема 6. Термодинамика растворов электролитов.

Задача 14. Из 1 л водного раствора, содержащего 1 г иода, иод экстрагируют сероуглеродом. Коэффициент распределения иода между водой и сероуглеродом равен 0,0017. Рассчитайте:

- массу иода, оставшегося в водном растворе после одной операции экстрагирования объемом 40 мл экстрагента;
- массу иода, оставшегося в водном растворе после 4-х кратного экстрагирования порциями по 10 мл сероуглерода;
- массу иода, которая извлекается сероуглеродом в случаях (а) и (б);
- степень извлечения иода в случаях (а) и (б);
- число операций экстрагирования порциями по 10 мл сероуглерода, необходимых, чтобы извлечь из водного раствора 97% иода.

Решение.

а) Воспользуемся уравнением для однократной экстракции:

$$KV_1 \quad 1 \cdot 0,0017 \cdot 1000 \\ m_1 = m_0 \frac{1}{KV_1 + V_2} = \frac{1}{0,0017 \cdot 1000 + 10} = 0,041 \text{ г},$$

где K – коэффициент распределения растворенного вещества;

m_0 – масса иода (г) в исходном водном растворе;

m_1 – масса иода, оставшегося в водном растворе (рафинате) после однократной операции экстрагирования;

V_1 – объем исходного водного раствора (мл);

V_2 – объем экстрагента (мл) в одной операции экстрагирования.

б) В случае многократной экстракции в рафинате остается

$$KV_{1n} \quad 0,0017 \cdot 1000 \quad 4 \\ m = m_0 \frac{1}{KV_1 + V_2} = 1 \cdot \frac{1}{0,0017 \cdot 1000 + 10} = 0,00044 \text{ г},$$

где n – число операций экстрагирования.

в) Перейдет в экстракт при четырехкратном экстрагировании

$$m_n = m_0 - m = 1 - 0,00044 = 0,99956 \text{ г}.$$

Массу экстрагированного вещества можно рассчитать и с помощью другого уравнения:

г) Степень извлечения вычислим как отношение массы иода, перешедшего в экстракт, к массе его в исходном водном растворе. В первом случае:

$$KV_1^4 \quad 0,0017 \cdot 1000 \quad 4 \\ m = m_0 [1 - \frac{1}{KV_1 + V_2}] = 1 \cdot [1 - \frac{1}{0,0017 \cdot 1000 + 10}] = 0,99956 \text{ г}$$

$$\alpha_1 = (1 - 0,041)/1 = 0,959 \text{ или } 95\%;$$

во втором случае:

$$\alpha_2 = 0,99956/1 = 0,99956 \text{ или } 99,956\%.$$

д) Число экстракций для достижения заданной степени извлечения при $V_2=10$ мл, найдем с помощью уравнения, использованного в п. (в):

$$\frac{KV_{1n}}{KV_1+V_2} = m_3/m_0 = 1 - \left(\frac{0,97}{0,99956} \right); \quad 0,97 = 1 - 0,145^n; \quad 0,03 = 0,145^n.$$

Отсюда

$$\lg 0,03 = n \lg 0,145; \quad n = \lg 0,03 / \lg 0,145 = (-1,5229 / -0,8386) = 1,82.$$

Т.е. число экстракций равно двум ($1,82 \approx 2$).

Тема 6. Термодинамика растворов электролитов.

Задача 15. Вычислить давление, необходимое для понижения температуры замерзания воды на 1° , и температуру, при которой будет плавиться лед при повышении давления на 1 атм. При 0°C удельная теплота плавления льда равна $333,5 \times 10^3 \text{ Дж/кг}$, плотность воды $0,9998 \times 10^3 \text{ кг/м}^3$, плотность льда $0,9168 \times 10^3 \text{ кг/м}^3$.

Решение: Используем уравнение Клапейрона для фазовых превращений в однокомпонентных системах:

$$\frac{\Delta p L}{\Delta T} = \frac{333,5 \times 10^3}{T \Delta V}$$

где $\Delta p/\Delta T$ – изменение давления фазового превращения при изменении температуры на 1 градус; L – удельная теплота фазового превращения при температуре T ; $\Delta V = (V_{ж} - V_{тв})$ – изменение удельного объема при фазовом переходе.

Удельные объемы – величины обратные плотности, следовательно:

$$V_{ж} = 1/9,998 \times 10^3 = 1,0002 \times 10^{-3} \text{ м}^3/\text{кг};$$

$$V_{тв} = 1/9,168 \times 10^3 = 1,0908 \times 10^{-3} \text{ м}^3/\text{кг};$$

$$\text{и } \Delta V = 1,0002 \times 10^{-3} - 1,0908 \times 10^{-3} = -9,06 \times 10^{-5} \text{ м}^3/\text{кг};$$

$$\frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{333,5 \times 10^3}{273(-9,06 \times 10^{-5})} = -134,8 \times 10^5 \text{ Па/К}$$

Знак «минус» указывает на то, что для уменьшения температуры кристаллизации воды (или плавления льда) давление должно быть повышенено. Следовательно, для понижения температуры замерзания воды на 1°C необходимо давление повысить на $134,8 \times 10^5 \text{ Па}$ (или 133 атм), т.е. довести его до 134 атм.

Изменение температуры фазового перехода при изменении давления на единицу найдем с помощью преобразования уравнения:

$$\frac{\Delta T}{\Delta P} = \frac{1}{-134,8 \times 10^5} = -0,0074 \times 10^{-5} \text{ К/Па};$$

$$\frac{\Delta T}{\Delta P} = \frac{1}{-133} = -0,0075 \text{ К/атм};$$

Следовательно, при повышении давления на 1 атм температура плавления льда уменьшается на $0,0075 \text{ К}$ и становится равной $-0,0075^\circ\text{C}$.

Тема 8. Электрохимия

Задача 16. Удельная электрическая проводимость $0,175 \text{ M}$ раствора аммиака равна $4,76 \times 10^{-4} \text{ Ом}^{-1}\text{см}^{-1}$. Подвижность ионов NH_4^+ и OH^- при 25°C соответственно равны $73,5$ и $198,3 \text{ Ом}^{-1}\text{см}^2\text{моль}^{-1}$. Рассчитайте молярную проводимость, степень и константу ионизации аммиака, его pK_b , концентрацию ионов водорода в растворе и его pH .

Решение: Удельная \aleph и молярная λ электрические проводимости связаны между собой соотношением

$$\lambda = \frac{\aleph \cdot 1000}{C},$$

где C – концентрация в моль/л, 1000 – пересчетный коэффициент из литров в см^3 .

Рассчитываем λ :

$$\lambda = \frac{4,76 \times 10^{-4} \cdot 1000}{0,175} = 2,72 \text{ Ом}^{-1}\text{см}^2\text{моль}^{-1}$$

Степень ионизации α можно вычислить с помощью отношения $\alpha = \lambda / \lambda_\infty$, где λ_∞ – молярная проводимость при бесконечном разведении, которая рассчитывается по закону Кольрауша: $\lambda_\infty = \lambda_+ + \lambda_-$ (λ_+ и λ_- – подвижности ионов):

$$\lambda_\infty = 73,5 + 198,3 = 271,8 \text{ Ом}^{-1}\text{см}^2\text{моль}^{-1}$$

Отсюда $\alpha = 2,72 / 271,8 = 0,01$.

В соответствии с законом разведения Оствальда $K = \alpha^2 C / (1 - \alpha)$, где K – константа ионизации электролита (в данном случае $K = K_b$ аммиака);

C – концентрация, выраженная в моль/л.

$$\text{Найдем } K_b: \quad K_b = 0,012 \cdot 0,175 / (1 - 0,01) = 1,77 \times 10^{-5},$$

$$\text{отсюда} \quad pK_b = -\lg K_b = 4,752.$$

Концентрация ионов OH^- в растворе будет равна αC :

$$C_{\text{OH}^-} = 0,01 \cdot 0,175 = 0,00175 \text{ моль/л.}$$

Отсюда $p\text{OH} = -\lg 0,00175 = 2,76$ и, значит, $pH = 14 - 2,76 = 11,24$.

Тема 8. Электрохимия

Задача 17. Написать формулу гальванического элемента, состоящего из медного электрода, погруженного в раствор сульфата меди с активностью $0,01 \text{ M}$ и цинкового электрода, погруженного в раствор хлорида цинка с активностью $0,02 \text{ M}$.

Решение: Опорным при составлении формулы гальванического элемента является электрохимический ряд напряжений металлов, приведенный ниже:

Электрохимический ряд напряжений металлов



Ослабление восстановительных свойств (активности) слева направо

Формула начинается со знака минус в круглых скобках, затем указывается металл, находящийся слева в ряду напряжений, в нулевой степени окисления. Ставится вертикальная черта, имеющая значение границы раздела между металлом и ионосодержащим раствором. За ней указывается активный ион. Далее следует вертикальная двойная черта, обозначающая границу между двумя полуэлементами и показывающая, что диффузный потенциал устранен. За двойной чертой (в зеркальном порядке) указывается активный ион второго полуэлемента и, через одинарную вертикальную черту, металл в нулевой степени окисления, находящийся в электрохимическом ряду справа. За ним следует знак «плюс» в круглых скобках. Под каждым из активных ионов подписывается соответствующая ему активность из условия задачи. Конечный результат должен выглядеть следующим образом:



0,02M 0,01M

Примечание: вместо активного иона позволительно указывать также и полную брутто формулу соли, в раствор которой погружен соответствующий электрод.

Тема 8. Электрохимия

Задача 18. Рассчитайте электродные потенциалы, ЭДС гальванического элемента $(-)Zn|ZnSO_4$ ($c=0,5M$)|| $CuSO_4$ ($c=1M$)| $Cu(+)$, изменение энергии Гиббса ΔG° и константу равновесия реакции, протекающей в нем при замыкании цепи ($T=25^{\circ}C$).

Решение: Потенциалы электродов вычислим с помощью уравнения Нернста:

$$E_{Me^{n+}/Me} = E_{Me^{n+}/Me}^{\circ} - \frac{RT}{nF} \ln a_{Me^{n+}} = E_{Me^{n+}/Me}^{\circ} - \frac{RT}{nF} \ln a_{Me^{n+}},$$

где $E_{Me^{n+}/Me}^{\circ}$ – стандартный электродный потенциал (см. Приложение); $a_{Me^{n+}}$ – активность соответствующих ионов в растворе; n – число электронов, участвующих в электродной реакции; F – число Фарadays (96500 Кл).

Для расчета активности $a = \gamma C$ находим в справочнике коэффициенты активности γ солей и подставляем их значения:

$$a_{Cu^{2+}} = 0,043 \times 1 = 0,043 \text{ моль/л}; a_{Zn^{2+}} = 0,063 \times 0,5 = 0,0315 \text{ моль/л}.$$

Отсюда

$$E_{Cu^{2+}/Cu} = +0,337 + (0,059/2) \lg 0,043 = +0,297 \text{ В};$$

$$E_{Zn^{2+}/Zn} = -0,763 + (0,059/2) \lg 0,0315 = -0,807 \text{ В}.$$

И, значит, электродвижущая сила равна

$$E = E_+ - E_- = +0,297 - (-0,807) = 1,104 \text{ В}.$$

Между ΔG° реакции, протекающей в гальваническом элементе, и стандартной ЭДС существует связь, выражаемая уравнением: $\Delta G^{\circ} = -nFE^{\circ}$.

Стандартная ЭДС рассчитывается как разность стандартных электродных потенциалов: $E^{\circ} = E_+^{\circ} - E_-^{\circ}$. Значит

$$E^{\circ} = +0,337 - (-0,763) = 1,100 \text{ В},$$

$$\text{и } \Delta G^{\circ} = -2 \cdot 96500 \cdot 1,100 = -212300 \text{ Дж/моль}.$$


Константа равновесия реакции ($K_a = K_p$) находится с помощью уравнения

$$\Delta G^{\circ} = -RT \ln K_p,$$

$$\text{откуда } \ln K_p = \ln K_a = -\Delta G^{\circ}/RT = -(-212300)/[8,314 \cdot (25+273)] = \\ = 85,6887 \text{ и } K_a = K_p = e^{85,6887} = 1,64 \times 10^{37}.$$

Тема 8. Электрохимия

Задача 19. Рассчитать растворимость и произведение растворимости сульфида цинка при $25^{\circ}C$. Электродвижущая сила концентрационного гальванического элемента



равна 0,276 В.

Решение: ЭДС данного концентрационного элемента определяется уравнением:

$$E = \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{Zn^{2+}}, (2)}{a_{Zn^{2+}}, (1)}.$$

Примем, что $a_{Zn^{2+}}, (1)$ – концентрация (активность) ионов цинка в насыщенном растворе ZnS , равная x . Тогда $a_{Zn^{2+}}, (2) = \gamma C = 0,063 \times 0,5 = 0,0315$ (см. предыдущую задачу).

Отсюда

$$\lg \frac{a_{Zn^{2+}}, (2)}{x} = \frac{nE}{RT} = \frac{0,276 \cdot 2}{0,059 \cdot 0,059} = 9,3559;$$

$$\frac{a_{Zn^{2+}}, (2)}{x} = 10^{9,3559} = 2,2693 \times 10^9;$$

$$\text{и далее: } x = a_{Zn^{2+}}, (1) = 0,0315 / (2,2693 \times 10^9) = 1,391 \times 10^{-11}.$$

Значит, концентрация сульфида цинка в насыщенном растворе равна $1,39 \times 10^{-11}$ моль/л, а его произведение растворимости –
 $\text{ПР} = C_{\text{Zn}}^{2+} \cdot C_{\text{S}}^{2-} = x^2 = (1,39 \times 10^{-11})^2 = 1,93 \times 10^{-22}$.

Тема 8. Электрохимия

Задача 20. Электродвижущая сила Е элемента, составленного из водородного и насыщенного каломельного электродов при 25°C равна 0,4185 В. Чему равны pH раствора, с которым контактирует водородный электрод, и активность ионов водорода в нем?

Решение:

$$\text{pH} = \frac{E - E_{\text{КЭ}}}{0,059};$$

(потенциал каломельного электрода берем из Приложения). Отсюда

$$\text{pH} = (0,4185 - 0,2415) / 0,059 = 3;$$

$$a_{\text{H}^+} = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3} = 0,001 \text{ моль/л.}$$

Задача 21. Константа скорости омыления этилацетата гидроксидом натрия при 10°C равна $2,38 \text{ мин}^{-1}$. Определить время, необходимое для омыления 90% этилацетата, если реакционная смесь получены смешением 1 л 0,05 н. раствора этилацетата с:

- 1) 1 л 0,05 н. раствора NaOH; 2) 1 л 0,1 н. раствора NaOH.

Решение:

1) Реакция омыления этилацетата в щелочной среде является реакцией второго порядка. В случае равенства концентраций эфира и щелочи воспользуемся уравнением :

$$k = \frac{1-x}{t_1 \cdot a(a-x)}, \text{ откуда } t_1 = \frac{1-x}{ka(a-x)},$$

где а – исходное количество молей; x – количество прореагированного вещества к моменту времени t.

Общий объем смеси 2 л, поэтому концентрация веществ вследствие разбавления уменьшится в два раза и значит,

$$a = 0,025 \text{ моль/л}, x = 0,025 \cdot 0,9 = 0,0225 \text{ моль/л.}$$

Отсюда

$$t_1 = \frac{1}{2,38} \cdot \frac{0,0225}{0,025(0,025-0,0225)} = 151,2 \text{ мин.}$$

2. Во втором случае концентрации эфира и щелочи неодинаковы, поэтому необходимо использовать уравнение:

$$k = \frac{1}{t_2(a-b)} \ln \frac{b(a-x)}{a(b-x)}$$


Если а - начальная концентрация этилацетата, а b – начальная концентрация щелочи, то $a = 0,1/2 = 0,05 \text{ моль/л}$; $b = 0,05/2 = 0,025 \text{ моль/л}$; $x = 0,025 \cdot 0,9 = 0,0225 \text{ моль/л}$.

Решаем уравнение относительно t_2 :

$$t_2 = \frac{1}{2,38 (0,05-0,025)} \ln \frac{0,025(0,05-0,0225)}{0,05(0,025-0,0225)} = 28,65 \text{ мин}$$

Тема 9. Кинетика химических реакций и катализ

Задача 22. Константа скорости диссоциации фосгена



при температуре 382°C равна $0,5 \times 10^{-2} \text{ мин}^{-1}$, а при температуре 482°C – $67,6 \times 10^{-2} \text{ мин}^{-1}$. Рассчитать: а) энергию активации реакции;

б) константу скорости реакции при температуре 425°C; в) количество фосгена, которое разложится при температуре 382°C за 100 минут после начала реакции, если начальное содержание его составляло 1 моль/л.

Решение:

а) Расчет энергии активации E^* ведем по уравнению:

$$E^* = \frac{T_1 T_2 R k_2}{T_2 - T_1 k_1} \ln \frac{67,6 \times 10^{-2}}{0,5 \times 10^{-2}},$$

где: k_1 и k_2 – константы скорости реакции соответственно при температурах T_1 и T_2 . Подставляем значения:

$$E^* = \frac{655 \cdot 755 \cdot 8,314}{755 - 655} \ln \frac{67,6 \times 10^{-2}}{0,5 \times 10^{-2}} = 201740,3 \text{ Дж/моль} \approx 201,7 \text{ кДж/моль}$$

б) Для расчета константы скорости реакции при 425°C воспользуемся тем же уравнением и найденным значением E^* .

$$\ln \frac{k_3 E^* T_3 - T_1}{k_1 R T_3 T_1} = \dots$$

Решая это уравнение относительно k_3 , получим:

$$\ln k_3 = \frac{201740}{8,314} - \frac{698 - 655}{698 \times 655} + \ln 0,5 \times 10^{-2} = -3,016,$$

откуда $k_3 = e^{-3,016} = 0,049$.

в) Реакция диссоциации фосгена является реакцией первого порядка. Поэтому количество прореагированного фосгена может быть рассчитано по уравнению:

$$k = \frac{1}{t} \ln \frac{C_0}{C_0 - x}, \text{ где}$$

C_0 – исходная концентрация вещества; $C_0 - x$ – концентрация к моменту времени t ; x – число молей прореагированного вещества.

Подставляя в это уравнение значение константы скорости реакции, время от начала реакции и исходную концентрацию, решаем уравнение относительно x :

$$0,5 \times 10^{-2} = (1/100) \ln [1/(1-x)]; \\ \ln [1/(1-x)] = 0,5; \quad \ln(1-x) = -0,5; \quad 1-x = e^{-0,5} = 0,6 \\ \text{и, окончательно, } x = 0,4 \text{ моля.}$$

Таким образом, при температуре 382°C за 100 минут от начала реакции концентрация фосгена уменьшится от 1 до 0,6 моль/л, так как в каждом литре разложится 0,4 моля фосгена.

Тема 9. Кинетика химических реакций и катализ

Задача 23. Во сколько раз возрастет скорость разложения сульфата натрия в глазных каплях при повышении температуры от 20 до 80°C? Температурный коэффициент скорости реакции равен 2.

Решение:

Воспользуемся соотношением $v_{T_2}/v_{T_1} = k_{T_2}/k_{T_1} = \gamma^{(T_2-T_1)}/10$, где $\gamma=2$, $T_2=80^\circ\text{C}$; $T_1=20^\circ\text{C}$:
 $V_{T_2}/V_{T_1} = 2^6 = 64$,

то есть скорость разложения возрастет в 64 раза.

Тема 9. Кинетика химических реакций и катализ

Задача 24. Рассчитайте время разрушения аэрозольного препарата «Камфомен» на 10%, считая константу скорости разложения основного действующего вещества (фурацилина) равной $1,2 \times 10^{-5} \text{ час}^{-1}$ при 20°C .

Решение: Считая исходное количество вещества равным 100%, и используя кинетическое уравнение для реакции 1-го порядка

$$k = \frac{1}{t} \ln \frac{a}{a-x},$$

получим:

$$t = \frac{1}{k} \ln \frac{100}{100-x} = \frac{0,1053}{1,2 \times 10^{-5}} = 8775 \text{ часов} \approx 1 \text{ год.}$$

Тема 9. Кинетика химических реакций и катализ

Задача 25. В течение какого времени через раствор сульфата меди необходимо пропускать ток силой 1,5 А, чтобы из него 6,4 г. меди ?

Решение: По закону Фарадея масса выделившегося вещества при электролизе (в граммах) $m = \mathcal{E}It/F$, где

\mathcal{E} – электрохимический эквивалент вещества

J – сила тока (ампер)

t – время (Сек) Кулон

F – число Фарадея 96494 К/г-экв () или 96500 К/г-экв.

Электрохимическим эквивалентом называется количества вещества, выраженное в граммах, выделяемое 1к электричества, проходящим через электролит.

$$\mathcal{E} = \frac{A}{n}, \text{ где}$$

A – атомная масса; n – валентность

Для меди

$$\mathcal{E} = \frac{63,54}{2} = 31,77 \text{ г/к}$$

mF

$$t = \frac{6,4 \cdot 96500}{\mathcal{E}J} = \frac{6,4 \cdot 96500}{31,77 \cdot 1,5} = 12959,8 \text{ сек} = 216 \text{ мин} = 3 \text{ ч. 36 мин.}$$

Примеры решения задач по колloidной химии

Тема 11. Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных систем.

Задача 26. Найти поверхностное натяжение анилина σ , если сталагмометрическим методом при 20°C получены следующие данные: число капель анилина $n = 42$, воды $n_0 = 18$. Плотность анилина $\rho = 1,4 \times 10^3 \text{ кг/м}^3$; поверхностное натяжение воды $\sigma_0 = 72,75 \times 10^{-3} \text{ Н/м}$.

Решение: Используем для расчета формулу:

$$\sigma = \sigma_0 \frac{n_0 \rho}{n n_0} = 72,75 \times 10^{-3} \frac{18 \cdot 1,4 \times 10^3}{42 \cdot 1 \times 10^3} = 43,65 \times 10^{-3} \text{ Н/м.}$$

Тема 11. Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных систем.

Задача 27. Найти поверхностное натяжение анилина, если методом наибольшего давления пузырьков получены данные: давление пузырьков при пропускании их через воду равно $11,8 \cdot 10^2 \text{ Н/м}$, а в анилин – 712 Н/м .

Температура 20°C , поверхностное натяжение воды $\sigma_0 = 72,75 \cdot 10^{-3} \text{ Н/м}$

Решение:

Используем для расчета формулу:

$$\sigma = \sigma_{H_2O} - \frac{h_{p-pa}}{h_{H_2O}} = 72,75 \times 10^{-3} - \frac{712}{11,8 \times 10^2} = 43,89 \times 10^{-3} \text{ Н/м.}$$

Тема 11. Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных систем.

Задача 28. Используя константы уравнения Шишковского ($a = 12,6 \times 10^{-3}$ и $b = 21,5$), рассчитайте поверхностное натяжение водного раствора масляной кислоты с концентрацией $0,104 \text{ моль/л}$ при 273К . Поверхностное натяжение воды при этой температуре $\sigma_0 = 75,62 \times 10^{-3} \text{ Н/м}$.

Решение: С помощью уравнения Шишковского

$$\Delta\sigma = \sigma_0 - \sigma = a \ln(1 + bC)$$

рассчитаем поверхностное натяжение раствора σ :

$$\sigma = \sigma_0 - a \ln(1 + bC) = 75,62 \times 10^{-3} - 12,6 \times 10^{-3}(1 + 21,5 \times 0,104) = \\ = 60,82 \times 10^{-3} \text{ Н/м.}$$

Тема 11. Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных систем.

Задача 29. Определите поверхностный избыток (в кмоль/м^2) при 10°C для водного раствора, содержащего 50 мг/л пеларгоновой кислоты $C_8H_{17}\text{COOH}$. Поверхностные натяжения исследуемого раствора и воды соответственно равны $57 \times 10^{-3} \text{ Н/м}$ и $74,22 \times 10^{-3} \text{ Н/м}$.

Решение: Используем уравнение Гиббса:

Выразим концентрацию раствора в кмоль/м^3 :

$$\Gamma = \frac{\Delta\sigma}{RT} = \frac{C}{\Delta C}$$

$C = 0,05/158 = 3,164 \times 10^{-4} \text{ моль/л} = 3,164 \times 10^{-4} \text{ кмоль/м}^3$, (158 – молярная масса пеларгоновой кислоты). Отсюда

$$\Gamma = \frac{(57 \times 10^{-3} - 74,22 \times 10^{-3})}{3,164 \times 10^{-4} - 0,314 \times 10^3 \times 283} = 7,32 \times 10^{-9} \text{ кмоль/м}^2.$$

Тема 11. Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных систем.

Задача 30. Определите длину молекулы масляной кислоты на поверхности раздела «раствор – воздух», если площадь, занимаемая одной молекулой в поверхностном слое, равна $30 \times 10^{-20} \text{ м}^2$, а плотность масляной кислоты $\rho = 978 \text{ кг/м}^3$.

Решение: Длина молекулы l рассчитывается по формуле

$$l = \frac{\Gamma_\infty M}{\rho}$$

Учитывая, что $S = \frac{1}{\Gamma_\infty N_A}$, (где N_A – число Авогадро, равное

$6,02 \times 10^{26}$ молекул/ кмоль), находим предельный поверхностный избыток:

$$\Gamma_\infty = \frac{1}{SN_A} = \frac{1}{30 \times 10^{-20} \times 6,02 \times 10^{26}} = 0,055 \times 10^{-7} \text{ кмоль/м}^2.$$

Тогда длина молекулы масляной кислоты ($M=88$):

$$1 = \frac{0,055 \times 10^{-7} \times 88}{978} = 4,95 \times 10^{-10} \approx 5 \times 10^{-10} \text{ м} = 5 \text{ \AA} \text{ (ангстрем).}$$


Тема 12. Электрический заряд коллоидных частиц и электрохимические явления.

Задача 31.

Напишите формулу мицеллы коллоидного раствора сульфата бария, полученного методом химической конденсации при взаимодействии BaCl_2 и Na_2SO_4 в водной среде.


Решение:

В основе получения золя лежит реакция:



Условием получения золя является небольшой избыток одного из исходных реагентов, BaCl_2 или Na_2SO_4 , который будет являться стабилизатором золя.

Пусть стабилизатором будет BaCl_2 , тогда формула мицеллы полученного золя:



Составные части мицеллы: 1 - агрегат

- 2 - потенциалопределяющие ионы
- 3 - противоионы адсорбционного слоя
- 4 - противоионы диффузного слоя

(1,2) - ядро; (1,2,3,) - гранула, заряженная частица;

(1,2,3,4,) - электронейтральная мицелла

Потенциалопределяющими ионами (от стабилизатора) становятся ионы Ba^{2+} согласно избирательной адсорбции по правилу Ф. Панета и К. Фаянса: на поверхности кристаллов из раствора преимущественно адсорбируются те ионы, которые могут образовать с ионами противоположного знака, входящими в кристаллическую решетку труднорастворимое соединение или достроить кристаллическую решетку. Ионы Cl^- - выполняют роль противоионов, причем общее их количество (в адсорбционном и диффузном слоях) эквивалентно количеству потенциалопределяющих ионов:



Тема 12. Электрический заряд коллоидных частиц и электрохимические явления.

Задача 32. Коллоидный раствор колларгола содержит частицы серебра с диаметром 6×10^{-8} см. Определите число частиц, образующихся при диспергировании $0,5 \text{ см}^3$ серебра, удельную поверхность золя и суммарную поверхность частиц, если они имеют: а) сферическую форму с диаметром (d) $6 \cdot 10^{-8}$ см

б) кубическую с длиной ребра (ℓ) 10^{-6} см.

Решение: Зная радиус, можно рассчитать объем одной частицы (сферической)

$$V_q = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}[3,14(3 \times 10^{-8})^3] = 113,04 \times 10^{-24} \text{ см}^3$$

$$V_{\text{куб. част.}} = \ell^3 = (10^{-6})^3 = 10^{-18} \text{ см}^3$$

Теперь определим число частиц:

$$n = V_{\text{дисп. фазы}} / V_q = 0,5 / 113,04 \times 10^{-24} = 4,4 \times 10^{21} \text{ (сферических)}$$

$$n = V_{\text{дисп. фазы}} / V_q = 0,5 / 10^{-18} = 0,5 \cdot 10^{18} \text{ (кубических)}$$

Удельную поверхность системы, содержащей сферические частицы, можно вычислить по формуле

$$S_{\text{уд.}} = \frac{3}{r} = \frac{3}{3 \times 10^{-8}} = 10^8 \text{ см}^{-1};$$

$$S_{\text{уд. куб.}} = \frac{6}{\ell} = \frac{6}{10^{-6}} = 6 \cdot 10^6 \text{ см}^{-1}$$

Зная $S_{\text{уд.}}$ и суммарный объем частиц дисперсной фазы, найдем суммарную поверхность частиц:

$$S_{\text{сумм}} = S_{\text{уд}} V_{\text{д.ф.}} = 10^8 \times 0,5 = 5 \times 10^7 \text{ см}^2 \text{ (сферич.)}; S_{\text{куб.}} = 6 \times 10^6 \times 0,5 = 3 \times 10^6 \text{ см}^2$$

Или иначе:

$$S_{\text{сумм}} = nS_q = n4\pi r^2 = 4,4 \times 10^{21} \bullet 4 \bullet 3,14 \bullet (6 \times 10^{-8})^2 = 4,97 \times 10^7 \approx 5 \times 10^7 \text{ см}^2.$$

Тема 13. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем

Задача 33. Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность раствора сульфата натрия по отношению к гидрозолю иодида серебра, если коагуляцию 250 мл золя вызывает сульфат натрия концентрации 0,15 моль/л объемом 50 мл.

Решение: Порог коагуляции выражается величиной концентрации электролита коагулятора, которая вызывает коагуляцию лиозоля. Коагуляция золей – процесс, приводящий к агрегации частиц дисперсной фазы с последующим образованием осадка (коагеля). Обозначают порог коагуляции γ или СК. Размерность – ммоль/л или моль/л.

$$\gamma = \frac{C_{\text{эк.}} \cdot V_{\text{эк.}}}{V_{\text{золя}} + V_{\text{эк.}}}; \quad \text{где}$$

$C_{\text{эк.}}$ – концентрация электролита коагулятора

$V_{\text{эк.}}$ – объем электролита коагулятора

$V_{\text{золя}}$ – объем золя

Коагулирующая способность электролита (коагулирующее действие)

$$P_K = \frac{1}{\gamma} \text{ л/моль};$$

$$\gamma = \frac{0,15 \cdot 0,05}{0,25 + 0,05} = 0,025 \text{ моль/л};$$

$$P_K = \frac{1}{0,025} = 40 \text{ л/моль}$$

Тема 13. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем

Задача 34. Рассчитайте коэффициент диффузии D и средний квадратичный сдвиг Δx частицы гидрозоля за время 10 секунд, если радиус частиц 50 нм, температура опыта 293К, вязкость среды 10^{-3} Па·с.

Решение: По закону Эйнштейна–Смолуховского

$$\Delta x^2 = 2Dt,$$

где D – коэффициент диффузии, который в свою очередь можно рассчитать по уравнению Эйнштейна:

$$D = \frac{RTkT}{6\pi\eta rN_A} = \frac{R}{6\pi\eta r} = \frac{kT}{6\pi\eta r},$$

R – универсальная газовая постоянная, 8,314 Дж/моль•К;

k – константа Больцмана, $k = R/N_A = 1,38 \times 10^{-23}$ Дж/К;

η – вязкость среды; r – радиус частицы.

Подставляем данные:

$$D = \frac{1,38 \times 10^{-23} \bullet 293}{6 \bullet 3,14 \times 10^{-3} \bullet 50 \bullet 10^{-9}} = 4,29 \times 10^{-12} \text{ м}^2/\text{с}.$$

Отсюда

$$\Delta x = \sqrt{2 \bullet 4,29 \times 10^{-12} \bullet 10} = 9,26 \times 10^{-6} \text{ м.}$$

Тема 13. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем

Задача 35. Протаргол содержит 0,08% коллоидного серебра. Оsmотическое давление этого коллоидного раствора равно 0,08 Па при температуре 37°C. Рассчитайте средний диаметр сферических коллоидных частиц золя. Плотность серебра $10,5 \times 10^3$ кг/м³.

Решение: Осмотическое давление золей рассчитывается по уравнению:

$$\pi_{\text{осм}} = \frac{vRT}{N_A} = v k T,$$

где v – число частиц в единице объема;
 k – константа Больцмана, $1,38 \times 10^{-23}$ Дж/К.

Так как v равно отношению массы дисперсной фазы к массе одной частицы: $v = m_{\text{д.ф.}}/m_q$,

$$r = \sqrt{\frac{3 m_{\text{д.ф.}} k T}{4 \pi_{\text{осм}} \rho \pi}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 0,8 \cdot 1,38 \times 10^{-23} \cdot 310}{4 \cdot 0,08 \cdot 10,5 \times 10^3 \cdot 3,14}} = 0,99 \times 10^{-8} \text{ м.}$$

а масса частицы находится через ее плотность и радиус: $m_q = 4\pi r^3 / 3\rho$, то, зная осмотическое давление, можно рассчитать средний радиус частицы:
Отсюда: $d = 2 \cdot 0,99 \times 10^{-8} = 1,98 \times 10^{-8} \text{ м.}$

Тема 13. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем

Задача 36.

Определить вязкость кастрорового масла, если через трубку длиной 0,6 м и диаметром 0,001 м оно протекает со скоростью $2,04 \cdot 10^{-10} \text{ м}^3/\text{спри}$ разности давлений 100 Па.

Решение: Воспользуемся уравнением Пуазеля:

$$Q = \frac{V}{t} = \frac{\pi \cdot r^4 \cdot \Delta P}{8 \cdot \eta \cdot \ell}$$

Q – объемная скорость течения жидкости, равная отношению объема жидкости V ко времени течения его по капилляру длиной ℓ и радиусом r под давлением P , η – динамическая вязкость жидкости.

Преобразуем уравнение для нахождения вязкости жидкости и решим его подставляя значения в системе СИ:

$$\eta = \frac{\pi \cdot r^4 \cdot \Delta P}{8 \cdot 2,04 \cdot 10^{-10} \cdot 0,6} = \frac{3,14 \cdot 0,0005^4 \cdot 100}{8 \cdot 2,04 \cdot 10^{-10} \cdot 0,6} = 20,04 \cdot 10^{-3} \text{ Па}\cdot\text{с}$$

$$8 \cdot Q \cdot \ell$$

Тема 13. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем

Задача 37. Рассчитайте вязкость гидрозоля AgCl с концентрацией дисперсной фазы: а) 10% по массе и б) 10% по объему. Частицы золя имеют сферическую форму; плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды соответственно равны $5,56$ и $1 \text{ г}/\text{см}^3$; вязкость дисперсионной среды $\eta_o = 10^{-3} \text{ Па}\cdot\text{с}$.

Решение: Найдем вязкость, используя уравнение Эйнштейна:

$$\eta = \eta_o(1+2,5\varphi),$$

где φ – объемная доля дисперсной фазы; $\varphi = V_{\text{д.ф.}}/V_{\text{золь.}}$

а) Для расчета φ примем массу золя, равной 100 г, тогда масса дисперсной фазы равна 10 г, а масса дисперсионной среды – 90 г. Отсюда

$$\varphi_1 = \frac{10/5,56}{10/5,56 + 90/1} = 0,0196;$$

$$\text{и } \eta_1 = 10^{-3} (1 + 2,5 \cdot 0,0196) = 1,05 \times 10^{-3} \text{ Па}\cdot\text{с.}$$

б) В этом случае для расчета осмотического давления достаточно преобразовать значение φ : $\varphi_2 = 10\% = 0,1$; и значит

$$\eta_2 = 10^{-3} (1 + 2,5 \cdot 0,1) = 1,25 \cdot 10^{-3} \text{ Па}\cdot\text{s}.$$

Тема 13. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем

Задача 38. Рассчитайте время оседания частиц суспензий бентонита в цилиндре с высоты 0,1 м. Вязкость среды $2 \cdot 10^{-3}$ Па·с, радиус частицы $14 \cdot 10^{-6}$ м, плотность бентонита $2,1 \cdot 10^3$ кг/м³, плотность жидкости $1,1 \cdot 10^3$ кг/м.

Решение:

Для расчета времени оседания воспользуемся формулой $U = \frac{h}{t}$, где

h - высота столба суспензии; t - время оседания частицы;
U - скорость оседания рассчитывается по уравнению Стокса:

$$U = \frac{2r^2(\rho - \rho_0)g}{9\eta}, \text{ где}$$

r - радиус частицы; ρ; ρ₀ - плотности вещества и среды;
g - ускорение свободного падения; η - вязкость среды

$$U = \frac{2(14 \cdot 10^{-6})^2 \cdot (2,1 \cdot 10^3 - 1,1 \cdot 10^3) \cdot 9,81}{9 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = 2,136 \cdot 10^{-4} \text{ м/сек.}$$

Тогда время оседания частицы равно

$$t = \frac{h}{U} = \frac{0,1}{2,136 \cdot 10^{-4}} = 468,1 \text{ сек.} = 7,8 \text{ мин.}$$

Тема 13. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем

Задача 39. Сравните интенсивность светорассеяния санорина в красном ($\lambda=700$ нм) и в синем свете ($\lambda=436$ нм). Сделайте вывод о том, какой свет лучше применять при нефелометрии.

$$n_1^2 - n_0^2 v V^2$$

$$I_p = \frac{24\pi^3}{n_1^2 + 2n_0^2 \lambda^4} I_o$$

Решение: В соответствии с уравнением Рэлея интенсивность рассеянного света обратно пропорциональна длине волны падающего света в 4-й степени. Отсюда

$$\frac{I_{p,\text{син.}} \lambda_{\text{крас}}^4}{I_{p,\text{крас.}}} = \frac{700^4}{436^4} = \frac{2,4 \times 10^{11}}{3,6 \times 10^{10}} \approx 6,6 \text{ раза}$$

Таким образом, при нефелометрии лучше применять синий свет.

Тема 13. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем

Задача 40. С помощью нефелометра сравнивались мутности двух гидрозолей – стандартного и исследуемого. Мутности стали одинаковыми при высоте освещенной части стандартного золя 5 · 10-3м, исследуемого золя – 19 · 10-3м. Средний радиус частиц стандартного золя 120 · 10-9м. Рассчитайте радиус частиц второго золя.

Решение: Расчет радиуса частиц исследуемого с помощью нефелометра золя проводят по формуле:

$$r_x = r_{\text{ст}} \sqrt{\frac{h_{\text{ст}}}{h_x}}, \text{ где}$$

h_{ст} - радиус частиц стандартного золя;

$h_{\text{ст}}$ и h_x - высота освещенной части стандартного и исследуемого золей

$$rx = 120 \cdot 10^{-9} \sqrt[3]{\frac{5 \cdot 10^{-3}}{19 \cdot 10^{-3}}} = 76,9 \cdot 10^{-9} \text{ м.}$$

Тема 14. Разные классы коллоидных систем

Задача 41. При изучении адсорбции паров этанола на активированном угле были получены следующие данные:

$p \times 10^{-2}$, Па	5,33	9,87	17,33	23,06	45,53
$A \times 10^3$, $\text{м}^3/\text{кг}$	14,9	19,1	24,2	27,3	36,8

(p – равновесное давление пара, A – величина адсорбции). Графически определите константы уравнений Фрейндлиха и Ленгмюра. Рассчитайте величину адсорбции при $p = 3000$ Па. Используя оба уравнения, вычислите, сколько этанола адсорбируется на 5 кг угля.

Решение: Для нахождения констант уравнения Фрейндлиха строят график зависимости $\lg A = f(\lg p)$. Для этого надо логарифмировать исходные данные:

$\lg A$	-1,83	-1,72	-1,62	-1,56	-1,43
$\lg p$	2,72	2,99	3,24	3,36	3,66

и построить по ним график:

Он отсекает от оси ординат отрезок, равный $\lg a = -3,02$; отсюда $a = 9,55 \times 10^{-4}$. По угловому коэффициенту графика находим второй коэффициент: $1/n = \tan \alpha = bc/dc = 0,4/0,94 = 0,43$. Теперь по уравнению Фрейндлиха $A = a p^{1/n}$

рассчитываем величину адсорбции:

$$A = x/m = 9,55 \times 10^{-4} \times 3000^{0,43} = 2,99 \times 10^{-2} \text{ м}^3/\text{кг.}$$

На 5 кг угля при этом адсорбируется

$$x = mA = 5 \times 2,99 \times 10^{-2} = 0,149 \text{ м}^3 \text{ этанола.}$$

Для нахождения констант уравнения Ленгмюра строят график зависимости $1/A = f(1/p)$. Для этого надо найти обратные значения:

$1/p$	0,00188	0,00101	0,00058	0,00043	0,00022
$1/A$	67,11	52,36	41,32	36,63	27,17

Строим по этим данным график и экстраполируем его на ось ординат.

По графику определяем отрезки:

$$OD = 1/A_\infty = 26; OB = 2/A_\infty = 52 \text{ кг}/\text{м}^3, OK = 1/b = 0,0011 \text{ Па}^{-1}.$$

Отсюда находим константы A_∞ и b :


$$A_\infty = 1/26 = 0,0385 \text{ м}^3/\text{кг};$$

$$b = 1/0,0011 = 909 \text{ Па.}$$

Зная константы, рассчитаем величину адсорбции по уравнению Ленгмюра:

$$A = A_\infty \frac{p}{b + p} = 0,0385 \frac{3000}{909 + 3000} = 29,5 \times 10^{-3} \text{ м}^3/\text{кг.}$$

Значит, на 5 кг угля адсорбируется $5 \times 29,5 \times 10^{-3} = 0,148 \text{ м}^3$ этанола.



Тема 14. Разные классы коллоидных систем

Задача 42. Характеристическая вязкость $[\eta]$ поливинилового спирта в водном растворе равна 0,53. Рассчитайте среднюю молярную массу поливинилового спирта с помощью констант уравнения Марка–Хаувинка–Куна: $K = 5,9 \times 10^{-4}$ и $\alpha = 0,67$.

Решение: Для удобства расчета средней молярной массы полимера уравнение Марка–Хаувинка–Куна $[\eta] = KM\alpha$ следует прологарифмировать: $\lg [\eta] = \lg K + \alpha \lg M$. Тогда

$$\lg [\eta] - \lg K = -0,2757 - (-3,2291)$$

$$\lg M = \frac{\lg [\eta] - \lg K}{\alpha} = \frac{-0,2757 - (-3,2291)}{0,67} = 4,4081$$

и значит $M = 10^{4,4081} = 25591,75 \approx 25592$.

2.4. Проведение круглого стола по теме «Физическая и коллоидная химия – как основополагающая дисциплина для освоения будущей специальности»

ОПК-1	Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов
Знать	Основные физико-химические и химические методы анализа для разработки, исследований, экспертизы, изготовления лекарственных средств
Уметь	Использовать основные физико-химические и химические методы анализа для разработки, исследований, экспертизы, изготовления лекарственных средств
Владеть	Методологией использования физико-химических и химических методов при решении профессиональных задач (разработка, исследования, экспертиза, изготовление лекарственных средств)

3. Промежуточная аттестация

3.1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Вопросы к экзамену:

- Специфические особенности дисперсных систем. Классификация дисперсных систем.
- Характеристика свойств дисперсных систем и особенности их поведения. Молекулярно-кинетические свойства и оптические свойства дисперсных систем.
- Седиментационно-диффузионное равновесие. Уравнение Лапласа. Гипсометрическая высота как критерий кинетической устойчивости.
- Условия равновесия поверхностного слоя с объемными фазами. Энергия поверхностного слоя. Поверхностное натяжение.
- Поверхностные явления. Адгезия и когезия. Смачивание и несмачивание. Уравнения Юнга и Дюпре-Юнга.
- Капиллярные явления. Дисперсность и реакционная способность.
- Адсорбция. Основные понятия и определения. Уравнение для расчета энергии Гиббса поверхности слоя.
- Природа сил, обуславливающих адсорбционные взаимодействия. Химическая и физическая адсорбция.
- Метод Гиббса и метод полного содержания. Понятие полных и избыточных адсорбций и их взаимосвязь.
- Способы экспериментального исследования адсорбционных равновесий. Изобары, изотермы и изостеры адсорбции.
- Теплоты адсорбции. Интегральные и дифференциальные теплоты. Причины зависимости теплот адсорбции от степени заполнения. Типы неоднородностей.
- Методы определения теплот адсорбции. Расчет теплот из изостер адсорбции.
- Уравнение Гиббса и его анализ. Поверхностная активность. Поверхностно-активные и поверхностью-инактивные вещества.
- Потенциальная теория Поляни. Основные положения. Понятие адсорбционного потенциала. Характеристическая кривая адсорбента.
- Адсорбция в идеальном адсорбционном слое. Изотерма Лэнгмиора и ее анализ. Линейные координаты изотермы Лэнгмиора.
- Полимолекулярная адсорбция. Теория БЭТ. Изотерма БЭТ и ее анализ. Модель Арановича.
- Определение удельной поверхности твердых адсорбентов.

18. Адсорбция на пористых адсорбентах. Теория объемного заполнения микропор. Уравнение теории ТОЗМ и уравнение Дубинина-Радушкевича.
19. Общие закономерности адсорбции на границе раздела фаз жидкость-жидкость и жидкость-газ. Уравнение Шишковского. Связь поверхностного натяжения и величин адсорбции на жидких поверхностях с концентрацией ПАВ.
20. Структура поверхностных слоев на границе раздела фаз жидкость-жидкость и жидкость-газ. Определение геометрических параметров молекул ПАВ.
21. Адсорбция в гомологических рядах органических соединений. Правило Дюкло-Траубе.
22. Адсорбция на границе раздела фаз твердое тело- жидкость. Основные особенности.
23. Изотерма адсорбции из растворов на твердых поверхностях в идеальном адсорбционном слое и ее анализ.
24. Влияние природы адсорбента, адсорбата и растворителя на закономерности адсорбции из растворов. Правило полярности Ребиндера.
25. Адсорбция электролитов. Основные особенности. Понятие двойного электрического слоя. Правило Фаянса-Пескова-Липатова.
26. Закономерности ионно-обменной адсорбции. Уравнение изотермы Никольского. Иониты, их классификация. Основные характеристики.
27. Хроматография. Основные принципы, сущность и классификация.
28. Механизмы образования ДЭС.
29. Теория строения ДЭС на границе раздела фаз твердое тело- жидкость. Распределение потенциала в ДЭС.
30. Строение и физико-химические свойства лиофобных дисперсных систем. Способы получения лиофобных дисперсных систем. Сущность методов диспергирования и конденсации.
31. Ионные слои как фактор устойчивости коллоидных систем. Строение мицеллы лиофобного золя. Электрокинетический потенциал.
32. Влияние температуры, природы растворителя, добавок электролитов на агрегативную устойчивость золей.
33. Индифферентные электролиты. Влияние добавок индифферентных электролитов на распределение потенциала в ДЭС и агрегативную устойчивость золей. Адсорбционная перезарядка.
34. Неиндифферентные электролиты. Влияние добавок неиндифферентных электролитов на распределение потенциала в ДЭС и агрегативную устойчивость золей.
35. Электрокинетические явления. Электрофорез. Определение электрокинетического потенциала по скорости электрофореза.
36. Коагуляция лиофобных золей. Закономерности электролитной коагуляции. Правило Шульце-Гарди. Лиотропные ряды.
37. Коагуляция смесью электролитов.
38. Кинетика коагуляции. Основные закономерности. Скорость коагуляции.
39. Теория быстрой коагуляции Смолуховского. Период коагуляции.
40. Теория медленной коагуляции Фукса.
41. Строение коллоидных частиц. Двойной электрический слой. Поверхностный и электрокинетический потенциалы, их зависимость от различных факторов.
42. Электрокинетические явления. Применение электрофоретических методов исследования.
43. Виды устойчивости дисперсных систем. Факторы устойчивости дисперсных систем. Коагуляция. Правило Шульце-Гарди.
44. Теории коагуляции Фрейндлиха, Мюллера и ДЛФО.
45. Порог коагуляции. Медленная и быстрая коагуляция. Кинетика коагуляции.
46. Механизм коагуляции электролитами. Зависимость коагуляции от размера и заряда иона. Чередование зон коагуляции. Коагуляция золей смесями электролитов. Гетерокоагуляция. Привыкание золей. Коллоидная защита.
47. Аэрозоли, их получение, классификация и свойства.
48. Порошки, их получение, классификация и свойства.
49. Сусpenзии, их получение и свойства. Устойчивость сусpenзий. Пасты.
50. Эмульсии и их классификация. Определение типа эмульсии. Устойчивость эмульсий. Эмульгаторы и механизм их действия. Обращение фаз эмульсий. Методы получения эмульсий. Пены.

51. Мицеллярные коллоидные системы. Критическая концентрация мицеллообразования. Солюбилизация.
52. Молекулярные коллоидные системы. Классификация ВМС. Молекулярная масса ВМС.
53. Свойства ВМС. Набухание и растворение ВМС. Устойчивость растворов ВМС.
54. Вязкость. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Закон Ньютона. Абсолютная, относительная, удельная, приведённая и характеристическая вязкость.
55. Уравнение Пуазеля. Экспериментальное определение вязкости. Реологическая классификация жидкостей.
56. Растворы ВМС, причины их аномальной вязкости. Уравнение Бинггама. Определение молекулярной массы ВМС вискозиметрическим методом.
57. Осмотические свойства растворов ВМС.
58. Полиэлектролиты и их классификация. Изоэлектрическое состояние. Мембранные равновесие Доннана и его влияние на осмотическое давление растворов полиэлектролитов.
59. Коацервация. Гелеобразование и студнеобразование, влияние различных факторов на эти процессы.
60. Свойства гелей и студней. Синерезис.
61. Диффузионно-седиментационное равновесие и его использование для анализа дисперсных систем.
62. Седиментационный анализ суспензий и эмульсий (теоретические основы, проведение и обработка экспериментальных данных).
63. Седиментационный анализ в центробежном поле как метод оценки размеров коллоидных частиц и макромолекул полимеров.
64. Межфазная поверхность, ее силовое поле. Поверхностное натяжение как характеристика термодинамическое границах).
65. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации раствора ПАВ.
66. Уравнение Шишковского. Поверхностная активность, её определение и изменение в гомологических рядах.
67. Капиллярное давление.
68. Уравнение Жюренена и его использование. Зависимость давления насыщенного пара от кривизны поверхности существующих фаз.
69. Уравнение двухмерного состояния вещества в адсорбционном слое. Типы Поверхностных Ленгмюра.
70. Адсорбция и ее характеристики. Теория мономолекулярной адсорбции Ленгмюра.
71. Причины образования и строения двойного электрического слоя на границе раздела фаз. Теории строения ДЭС. Современная модель строения мицеллы гидрофобного золя.
72. Электрокинетический потенциал двойного электрического слоя частиц гидрофобных золей. Влияние индифферентных и неиндифферентных электролитов, концентрации и температуры на электрокинетический потенциал.
73. Устойчивость растворов ВМС. Высаливание. Зависимость порогов высаливания полиамфолитов от pH среды.
74. Коацервация простая и комплексная. Микрокоацервация. Биологическое значение коацервации.
75. Заудневание. Влияние различных факторов на скорость заудневания.

3.2. Вопросы базового минимума по дисциплине «Физическая и коллоидная химия»

1. Первое начало термодинамики. Понятия теплоты, работы, теплоемкости, энталпии.
2. Второе начало термодинамики. Энтропия как функция состояния системы.
3. Третий закон термодинамики. Абсолютная и стандартная энтропия. Расчет ΔS в химической реакции.
4. Термодинамика фазовых равновесий. Однокомпонентные, бинарные системы. Правило фаз Гиббса.
5. Термодинамика химического равновесия. Уравнение изотермы химической реакции. Его использование.
6. Равновесие гетерогенных химических реакций.
7. Коллигативные свойства растворов.
8. Химическая кинетика.
9. Катализ

10. Предмет, задачи и методы физической химии.
11. Применение правила фаз Гиббса к однокомпонентным системам (на примере диаграммы строения воды).
12. Адсорбция растворенных веществ на твердой поверхности.
13. Основные особенности коллоидного состояния.
14. Двойной электрический слой, его строение. Понятие об электрическом потенциале.
15. Адсорбция на границе жидкость- газ. Уравнение Лангмюра, Фрейндлиха.
16. Общие представления об устойчивости и коагуляции коллоидных систем.
17. Предмет, задачи и методы физической химии.
18. Предмет, задачи и методы термодинамики. Основные законы, понятия.
19. Термический анализ. Построение диаграмм плавкости (состояния) двухкомпонентных систем с конденсированными фазами.
20. Аэрозоли, пасты.
21. Внутренняя энергия, теплота и работа.
22. Мыла. Синтетические моющие средства. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ).
23. Поверхностные явления. Процессы адгезии, когезии, смачивания. Поверхностное натяжение и поверхностная активность.
24. Предмет, задачи и методы колloidной химии. История развития как науки.
25. Способы получения коллоидных систем.
26. Мицелла.
27. Свойства молекулярно-кинетические.
28. ТД поверхностного слоя.
29. Адсорбция.
30. ПАВ.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.

4.1 Перечень компетенций с указанием индикаторов, планируемых результатов обучения и критериев оценивания освоения компетенций

Формируемая компетенция	Индикаторы сформированности компетенций	Содержание компетенции/индикатора	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения (дескрипторы) по пятибалльной шкале				
				1	2	3	4	5
ОПК-1		Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов.	Знать: Основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов.	Отсутствие знаний основных биологических, физико-химических, химических, математических методов для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов.	Фрагментарные знания основных биологических, физико-химических, химических, математических методов для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов.	Общие, но не структурированные знания основных биологических, физико-химических, химических, математических методов для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов.	В целом сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания основных биологических, физико-химических, химических, математических методов для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов.	Сформированные систематические знания основных биологических, физико-химических, химических, математических методов для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов.
			Уметь: Использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и	Отсутствие умений использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и	Частично освоенные умения использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и	В целом успешно, но не систематически осуществляемые умения использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и	В целом сформированные, но содержащие отдельные пробелы, умения использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и	Сформированные систематические умения использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и

		препарата.	препарата.	лекарственных препаратов.	анализа в изготовлении лекарственных препаратов.	анализа в изготовлении лекарственных препаратов.	лекарственных препаратов.
		Владеть: Способностью применять основные методы физико-химического анализа в изготовлении лекарственных препаратов.	Отсутствие способности применять основные методы физико-химического анализа в изготовлении лекарственных препаратов.	Фрагментарные способности применять основные методы физико-химического анализа в изготовлении лекарственных препаратов.	В целом успешно, но не систематически проявляемые способности применять основные методы физико-химического анализа в изготовлении лекарственных препаратов.	В целом сформированные, но содержащие отдельные пробелы, способности применять основные методы физико-химического анализа в изготовлении лекарственных препаратов.	Успешное и систематическое применение методов физико-химического анализа в изготовлении лекарственных препаратов.
ОПК-1.4	Применяет математические методы и осуществляет математическую обработку данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного	Знать: Математические методы обработки данных, полученных в ходе исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и биологических объектов.	Отсутствие знаний математических методов обработки данных, полученных в ходе исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и биологических объектов.	Фрагментарные знания математических методов обработки данных, полученных в ходе исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и биологических объектов.	Общие, но не структурированные знания математических методов обработки данных, полученных в ходе исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и биологических объектов.	В целом сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания математических методов обработки данных, полученных в ходе исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и биологических объектов.	Сформированные систематические знания математических методов обработки данных, полученных в ходе исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и биологических объектов.

2.2 Шкала, и процедура оценивания

4.2.1. Процедуры оценивания компетенций (результатов)

№	Компоненты контроля	Характеристика
1.	Способ организации	традиционный
2.	Этапы учебной деятельности	текущий контроль, промежуточный контроль
3.	Лицо, осуществляющее контроль	преподаватель
4.	Массовость охвата	индивидуальный
5.	Метод контроля	Устный ответ, стандартизированный тестовый контроль, решение ситуационных задач, презентации, проведение круглого стола

4.2.2. Шкалы оценивания компетенций (результатов освоения)

Для устного ответа:

- Оценка "отлично" выставляется студенту, если он глубоко иочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, причем не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятное решение, владеет разносторонними навыками и приемами обоснования своего ответа.
- Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, владеет необходимыми навыками и приемами обоснования своего ответа.
- Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
- Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями излагает материал.
- Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут изложить без ошибок, носящих принципиальный характер материал, изложенный в обязательной литературе.

Для стандартизированного тестового контроля:

Оценка «отлично» выставляется при выполнении без ошибок более 90 % заданий.

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении без ошибок более 70 % заданий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок более 50 % заданий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок менее 50 % заданий.

Для оценки решения ситуационной задачи:

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы

Для оценки презентаций:

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее адекватной форме. Информация является актуальной и современной. Ключевые слова в тексте выделены.

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют тексту. Орфографические,

пунктуационные, стилистические ошибки практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые слова в тексте выделены.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и современной. Ключевые слова в тексте не выделены.

Для оценки проведения круглого стола:

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает поставленные задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования полученных знаний.

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения компетенции – достаточный. Обучающийся решает поставленные задачи, иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования полученных знаний.

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и умениями.

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального характера, не может их исправить даже при наличии большого количества наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и умениям

4.3. Шкала и процедура оценивания промежуточной аттестации

Критерии оценки экзамена:

Оценка «отлично» выставляется, если при ответе на все вопросы билета студент демонстрирует полную сформированность заявленных компетенций, отвечает грамотно, полно, используя знания основной и дополнительной литературы.

Оценка «хорошо» выставляется, если при ответе на вопросы билета студент демонстрирует сформированность заявленных компетенций, грамотно отвечает в рамках обязательной литературы, возможны мелкие единичные неточности в толковании отдельных, не ключевых моментов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе на вопросы билета студент демонстрирует частичную сформированность заявленных компетенций, нуждается в дополнительных вопросах, допускает ошибки в освещении принципиальных, ключевых вопросов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе на вопросы билета у студента отсутствуют признаки сформированности компетенций, не проявляются даже поверхностные знания по существу поставленного вопроса, плохо ориентируется в обязательной литературе.